102年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師中醫師考試
分試考試、中醫師、營養師、心理師、醫事檢驗師、護理師、
社會工作師考試、特種考試聽力師、牙體技術人員考試、
102年專門職業及技術人員特種考試語言治療師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：中醫師
科　　目：中醫臨床醫學㈡（包括中醫內科學、中醫婦科學、中醫兒科學）
考試時間：1 小時 30 分　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 80 題，每題 1.25 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 某支氣管擴張症患者，症見發熱惡風，胸悶作痛，煩躁不安，咳嗽氣急，氣短不能平臥，頭痛乏力，自汗不止，咯唾膿痰，尤以晨間咯痰最多，時見痰中帶血，或滿口咯血；舌紅、苔黃，脈弦數。其診斷最可能爲下列何證？
㈠風熱襲表，熱毒犯肺　　㈡熱毒內蘊，瘀血阻滯
㈢熱毒久蘊，氣陰虧耗　　㈣痰熱壅肺，木火刑金

2 張小姐昨天起因感冒而咳嗽，咽乾痛，痰微黃，頭暈，太陽穴痛，無發燒惡寒，苔薄白，紅舌，脈浮滑數。治以下列何者最適宜？
㈠小柴胡湯　㈡桑菊飲　㈢瀉白散　㈣定喘湯

3 某 45 歲女性患者，自訴最近因爲有同事感冒，昨天開始也出現惡寒、四肢痠痛、鼻塞、涕白、咽癢則咳嗽、痰白等症狀。診其脈浮緊，苔白、舌淡紅。治以下列何方最適宜？
㈠荊防敗毒散　㈡金沸草散　㈢桂枝湯　㈣辛夷散

4 下列有關支氣管擴張症之敘述，何者錯誤？
㈠屬中醫咳血、肺癰等病的範疇　　㈡痰、火、瘀往往貫穿本病的整個過程
㈢正確的內科辨證論治，大部分的患者會痊癒　　㈣細菌感染急性發作期，發熱時應按熱證護理

5 某 8 歲幼童，夜間咳嗽已 1 個月，接近凌晨時喉中痰鳴如吼，痰色黃黏，咳吐不利，口渴喜冰飲，舌苔黃、質紅，脈滑數。自測峰速計值比率（peak expiratory flow rate）介於 60%到 80%。治以下列何法最適宜？
㈠溫肺散寒　㈡清熱宣肺　㈢清熱潤肺　㈣滌痰降氣

6 承上題，治以下列何方最適宜？
㈠定喘湯　㈡三子養親湯　㈢射干麻黃湯　㈣銀翹散

7 某 20 歲男性患者，因經常流連網咖，熬夜打電玩，數月之後開始出現心悸煩躁，失眠健忘，頭昏頭暈，耳鳴眼花，口咽乾燥，手足心熱。診其脈細數，舌紅、苔少。下列何者爲最可能的診斷？
㈠心腎陰虛　㈡心脾血虛　㈢心膽氣虛　㈣脾腎陽虛

8 某 34 歲女性患者，有心臟二尖瓣脫垂併心律不整病史。來診時症見面色黃白偏暗，主訴近一個月頻發生心悸與心律不整，多於睡眠之中發作，發作時胸悶，左前胸連肩臂及手指緊痛。最近覺手足冰冷，頻尿，口淡，涎唾量多，常有黏痰，白帶量多。自覺服補藥會改善，平時舌苔少、舌質淡紅，脈來沉細弱無力。本病病機最可能爲下列何者？
㈠脾陽虛衰，無以制水　　㈡心腎陽虛，水氣凌心
㈢衝任虛寒，帶脈失約　　㈣三焦決瀆失司，水飲泛溢

9 承上題，依中醫辨證論治原則，本病治以下列何者最宜？
㈠實脾飲　㈡真武湯　㈢炙甘草湯　㈣四逆湯

10 某 25 歲女性患者，主訴精神抑鬱近半年。家人代述其餘症狀尚有表情淡漠，神志痴呆，語無倫次，喃喃自語，喜怒無常，不思飲食。診其舌苔膩，脈弦滑。其診斷最可能爲下列何者？
㈠痰氣鬱結　㈡心脾兩虛　㈢痰火上擾　㈣火盛傷陰

11 承上題，治以下列何方最適宜？
㈠順氣導痰湯　㈡養心湯　㈢生鐵落飲　㈣二陰煎

12 「心主血脈」意謂心臟主控人體的血流循環。下列有關血液調控功能的論述，何者錯誤？
㈠肝藏血、肺朝百脈　㈡血汗同源，故奪血者無汗，奪汗者無血
㈢人動則血運於諸經，人靜則血歸於心　㈣目受血而能視，足受血而能步

13 某患者大便秘結，面色無華，頭暈目眩，心悸，唇舌淡，脈細澀。治以下列何方最適宜？
㈠黃耆湯　㈡麻子仁丸　㈢《尊生》潤腸丸　㈣濟川煎

14 某患者脘腹滿悶，時輕時重，喜溫喜按，納呆便溏，神疲乏力，舌質淡，苔薄白，脈細弱。其辨證最可能爲下列何者？
㈠脾胃虛弱　㈡中氣下陷　㈢脾腎陽虛　㈣胃寒

15 某患者主訴胸膈疼痛，食不得下，或雖下而復吐出，甚至水飲難下，大便堅如羊屎，或吐出物如赤豆汁，形體消瘦，面目肌膚枯燥晦滯。診其舌紅少津，舌質紫暗，脈細澀。治以下列何法最適宜？
㈠開鬱化結，潤燥降氣　㈡滋養津液，瀉熱散結
㈢破結行瘀，滋陰養血　㈣溫補脾腎，益氣回陽

16 某患者來診主訴呃逆多日，其呃聲低弱無力，氣不得續，面色蒼白，手足不溫，食少困倦。診其舌淡、苔白，脈沉細弱。治以下列何方最適宜？
㈠補中益氣湯加吳茱萸、丁香　㈡理中湯加吳茱萸、丁香
㈢苓桂朮甘湯加吳茱萸、丁香　㈣小半夏加茯苓湯加吳茱萸、丁香

17 腹痛泄瀉，每因抑鬱，惱怒或情緒緊張時誘發或加重，多伴有胸脅脹悶，噯氣食少，舌淡紅，脈弦。治以下列何法最適宜？
㈠解鬱疏肝　㈡疏肝和胃　㈢抑肝扶脾　㈣調和脾胃

18 某 26 歲女性患者，近日腹瀉 7-8 次，前 2-3 天大便臭，後變成水樣且腥味變重，日 4-5 行。診其苔白滑、質淡紅，脈濡。治以下列何方最適宜？
㈠葛根芩連湯　㈡胃苓湯　㈢藿香正氣散　㈣痛瀉要方

19 下列有關黃疸之敘述，何者錯誤？
㈠《內經》首創黃疸之病名
㈡《金匱要略》：「黃家所得，從熱得之」
㈢萎黃爲目睛與小便均不黃，這是與黃疸最根本的鑑別點
㈣黃疸之黃分布均勻，遍及整個眼白

20 某 44 歲男性患者，罹患慢性 B 型肝炎。今日來診，主訴全身疲倦，頭重不舒，胸悶，口渴、口苦，小便黃赤。診其脈：弦滑；望其舌：苔黃膩。肝功能指數分別爲 AST: 126 IU/L，ALT: 206 IU/L。治以下列何方最適宜？
㈠甘露消毒丹　㈡三仁湯　㈢胃苓湯　㈣柴胡疏肝散

21 下列有關脅痛之敘述，何者錯誤？
㈠病位主要在肝、膽，且與脾、胃、腎有關
㈡血瘀證：以刺痛爲主，且痛處固定不移，疼痛持續不已，白天常較夜間痛甚
㈢氣滯證：以脹痛爲主，且游走不定，痛無定處，時輕時重，每因情緒變化而增減
㈣實證以氣滯、血瘀、濕熱爲主；虛證多屬精血虧損，肝失所養的陰傷證

22 某 19 歲女性患者，腰痛劇烈，不能俯仰，平日不喜飲水，小便量少無不適感，喜食炸物、肉類，胃口佳，但大便量少。觀其舌質淡紅、尖有朱點、苔薄白，診其脈弦，扣其腰部，無敲擊痛。尿檢無異常，腹部 X-ray 無結石。治以下列何方最適宜？
㈠增液承氣湯合芍藥甘草湯　㈡導痰湯合柴胡疏肝散
㈢大分清飲合金鈴子散　㈣身痛逐瘀湯合當歸芍藥散

23 某 34 歲男性患者，主訴遺精易發數月，特別是較爲繁忙時容易發生。見其面色不華，自言容易疲勞，心悸、健忘，胃口不好，大便易溏。診其舌色淡白、苔薄白，脈弱。治以下列何方最適宜？
㈠六味地黃丸　㈡妙香散　㈢金鎖固精丸　㈣左歸飲

24 馬兜鈴酸引起的腎臟損害主要是影響下列何種細胞？
㈠腎小管上皮細胞　㈡腎絲球細胞　㈢腎膈細胞　㈣血管內皮細胞

25 某病患因代謝性酸中毒（Metabolic Acidosis）繼發代償性過度呼氣，臨床表現呼多吸少，這種呼吸型態的表現，較接近於下列那一種中醫證型？
㈠肺失宣發　㈡腎不納氣　㈢肝不疏泄　㈣肺失肅降

26 小便不暢或點滴不通，咽乾煩渴欲飲，呼吸急促或咳嗽，苔薄黃，脈數，爲肺熱壅盛型癃閉，可用清肺飲治療。下列辨證與加減方治療，何者錯誤？
㈠如患者出現心煩，舌尖紅或口舌生瘡等心火旺的徵象，可加黃連、竹葉等以清心火
㈡如大便不通，可加杏仁、大黃以宣肺通便
㈢如兼表症而見頭痛、鼻塞、脈浮，可加荊芥、防風以解表宣肺
㈣如肺熱漸清而肺陰虧耗，症見舌紅少津者，治宜滋養肺陰，以清潤爲主，方用百合飲子

27 某 60 歲男性勞工，最近常常有小便解不乾淨的問題，他覺得尿常常留在尿道中，老是抖不出來，同時引發小腹痛，小便不順暢，尤其是疲累時更明顯。其病症屬下列何者？
㈠膏淋　㈡氣淋　㈢勞淋　㈣寒淋

28 某患者其主症爲全身浮腫，見腰以下至四肢水腫，按之凹陷不易恢復，脘腹脹悶，食少便溏，面色萎黃，腰酸畏寒，神疲乏力，肢冷小便短少。其診斷最可能爲下列何者？
㈠肺腎陽虛　㈡脾腎陽虛　㈢心腎陽虛　㈣心脾兩虛

29 程氏萆薢分清飲有清熱利濕，分清泄濁的功用，有關其藥物組成與功用，下列敘述何者錯誤？
㈠白朮、茯苓健脾除濕　㈡蓮子心、丹參清心活血通絡
㈢黃柏、車前子清熱利濕　㈣烏藥、青皮破氣順氣

30 下列那些症狀是消渴中「消」的主要症狀，也是癭病陰虛火旺型的主要症狀？①多食易肌　②多飲多尿　③急躁易怒
㈠①　㈡①②　㈢①③　㈣①②③

31 關於消渴的治療原則，下列敘述何者正確？①上消宜常滋潤，慎用攻伐　②中消胃火不宜久用苦寒，苦寒太過，反生中滿之證　③上、中二消需避免治腎之藥以免生滋膩
㈠①②　㈡①③　㈢②③　㈣①②③

32 紅斑性狼瘡的病人常會發燒，從中醫的角度思考，下列相關敘述何者錯誤？
㈠若有感受外邪之發熱，乃正邪相爭，應辨證論治
㈡若久病陰虛發熱，可考慮朱丹溪之養陰降火法
㈢若見陽虛發熱之證，可考慮以右歸飲治之
㈣雖屬氣虛發熱，仍不可用補中益氣湯

33 某 50 歲男性患者，罹患白塞病（Behcet’s Disease）多年，近日出現壯熱、或低熱纏綿，口腔、下陰潰爛，下肢出現紅斑結節，納呆腹脹，觸之疼痛，舌苔黃膩，脈滑數等情形。治以下列何方最適宜？
㈠血府逐瘀湯　㈡百合地黃湯　㈢甘露消毒丹　㈣陽和湯

34 承上題，若出現外陰紅腫潰瘍，則以下列何者煎湯外洗最適宜？
㈠野菊花、苦參根　㈡玄參、荊芥　㈢萆薢、玉米鬚　㈣忍冬藤、絡石藤

35 某 30 歲男性患者，罹患僵直性脊椎炎多年，已出現駝背狀態；若再伴有腰脊強痛，轉側不利，遇風痛甚等情形，則於辨證基礎下再配伍下列何藥最適當？
㈠半夏、天南星　㈡白花蛇、蜈蚣　㈢羌活、防風　㈣紅花、當歸

36 下列有關久痹之敘述，何者正確？①痹證日久不癒，反覆發作，易出現痰瘀阻絡，氣血虧虛及臟腑痹的證候　②痰瘀阻絡症見肢體關節疼痛時輕時重，關節腫大，甚至強直畸形，屈伸不利　③舌質色紫或有瘀點瘀斑、脈細澀爲血瘀痰凝之象　④可加威靈仙、雞血藤養血活血；白芥子、膽南星搜風通絡　⑤久痹因痰瘀阻絡亦可以身痛逐瘀湯爲基礎方進行治療
㈠①③④⑤　㈡①②③④　㈢①②③⑤　㈣②③④⑤

37 糖尿病，多食易飢，形體消瘦，口臭，牙齦腫痛，大便乾燥，舌紅苔黃燥，脈滑實有力，治以下列何方最適宜？
㈠麻子仁丸　㈡玉女煎　㈢防風通聖散　㈣白虎加人參湯

38 關於癭腫的表現與其病機的關係，下列敘述正確的共有幾項？①頸前腫塊較大，兩側對稱，腫塊光滑柔軟，其主要病機爲氣鬱痰阻　②若癭腫出現局部結節，如核桃大小，質地較硬者，其主要病機爲氣鬱痰結血瘀　③若患者出現煩熱，急躁易怒，面部烘熱，口苦，其病機爲肝火亢盛
Ⓐ 0 項　Ⓑ 1 項　Ⓒ 2 項　Ⓓ 3 項

39 某 45 歲女性爲橋本氏病患者，甲狀腺機能低下，面腫蒼白少華，神疲肢軟，手足麻木，少氣頭暈，四肢不溫，納呆，口淡乏味，便溏，月經後期，舌質淡胖，脈沉遲無力。治以下列何方最適宜？
Ⓐ補中益氣湯　Ⓑ右歸丸　Ⓒ養心湯　Ⓓ六君子湯

40 華醫師和弟子討論「陰虛盜汗」病案時，指出「當歸六黃湯」爲治陰虛火旺之代表方，但臨床常因證加減，下列加減法何者錯誤？
Ⓐ兼氣虛時可加黨參　Ⓑ汗出多者，加牡蠣、浮小麥
Ⓒ火熱不甚者，可去生地黃與熟地黃　Ⓓ虛熱甚者，加秦艽、銀柴胡

41 某女性患者，就診時自訴近一個月來咽中常覺有痰，吞不下，咯不出，胸悶脅脹，伴見嘔心，口苦。診其舌淡紅偏紅，苔黃而膩，脈弦滑略數。其病機最可能爲下列何者？
Ⓐ肝氣鬱結，鬱而化火　Ⓑ肝鬱乘脾，生濕聚痰
Ⓒ肝鬱脾虛，虛火上攻　Ⓓ肝鬱乘脾，痰鬱化熱

42 承上題，治以下列何方最適宜？
Ⓐ柴胡疏肝散加青皮、鬱金　Ⓑ丹梔逍遙散合左金丸
Ⓒ半夏厚朴湯加佛手、旋覆花　Ⓓ溫膽湯加黃芩、瓜蔞皮

43 某 50 歲男性患者，近 2 個月常覺頭痛、眩暈、耳鳴眼花、震顫、失眠、口苦，且會因惱怒加重。見其舌紅苔黃、脈弦細數，量其血壓爲 170/90 mmHg。治以下列何方最適宜？
Ⓐ半夏白朮天麻湯　Ⓑ加味逍遙散　Ⓒ六味丸　Ⓓ天麻鉤藤飲

44 下列關於「眩暈」之敘述何者正確？
Ⓐ眩是頭昏，暈是眼花，二者常同時並見
Ⓑ輕者閉目即止，重者如坐車船，旋轉不定，不能站立，甚則昏倒
Ⓒ就治法而言，丹溪主張治虛爲主
Ⓓ臨床所見則以痰濁壅遏者居多

45 中醫學所稱的「伏梁」與下列何種西醫學的癌症最相似？
Ⓐ肺癌　Ⓑ胃癌　Ⓒ甲狀腺癌　Ⓓ膀胱癌

46 某 65 歲女性患者，因癌腫致下肢水腫甚。依元代危亦林《世醫得效方》及唐代孫思邈《千金要方》所論述，本患者最可能需要的飲食禁忌爲下列何者？
Ⓐ糖　Ⓑ多食魚肉　Ⓒ鹽　Ⓓ多喝水

47 放射治療腫瘤，以根治劑量治療後，依中醫辨證論治，下列何項證型最多見？
Ⓐ氣虛　Ⓑ脾虛　Ⓒ陰虛夾瘀　Ⓓ熱毒傷陰

48 某 32 歲女性罹患肺腺癌，就診時發現咯痰不爽，痰中帶血，胸痛氣急，痛處固定，唇甲紫黯，舌質暗有紫斑、瘀點，苔薄黃，脈弦澀。治以下列何方最適宜？
Ⓐ導痰湯　Ⓑ血府逐瘀湯　Ⓒ百合固金湯　Ⓓ小陷胸湯

49 在《婦科心法》的記載中，以下列何者治療經水過期不至，因血氣凝滯脹痛者？
Ⓐ人參養榮湯　Ⓑ過期飲　Ⓒ溫經攝血湯　Ⓓ大營煎

50 某 48 歲患者，主訴近三次月經來潮時間依序爲該年之 8 月 25 日、9 月 10 日、11 月 5 日，並見經量減少，情緒低落，頭暈耳鳴，腰酸。診其舌質淡紅，苔薄白，脈沉弦細。下列相關敘述何者錯誤？
Ⓐ月經週期屬於月經先後不定期　Ⓑ可能因爲更年期卵巢功能紊亂所引起
Ⓒ辨證爲肝腎不足　Ⓓ治療可以《傅青主女科》清經散爲主方

51 承上題，最適宜的處方，其組成爲下列何者？
Ⓐ當歸、白芍、柴胡、白朮、茯苓、生薑、薄荷、炙甘草
Ⓑ當歸、白芍、柴胡、熟地、菟絲子、山藥、茯苓、荊芥
Ⓒ熟地、山藥、山茱萸、枸杞、杜仲、肉桂、附子、甘草
Ⓓ熟地、白芍、茯苓、丹皮、地骨皮、黃柏、青蒿

52 下列情況共有幾項可稱爲「月經過多」？①經量明顯超過本人原有的正常量　②行經時間延長且總量較以往明顯增多　③月經週期規律但總量較以往明顯增多　④月經週期規律，自覺經量較他人多者
㈠ 4 項　㈡ 3 項　㈢ 2 項　㈣ 1 項

53 《醫宗金鑑・婦科心法》主張婦人經前腹脹甚於腹痛的病機，下列何者正確？
㈠胞中虛寒　㈡氣滯其血　㈢血凝礙滯　㈣寒濕互滯

54 承上題，最宜下列何者治療？
㈠當歸、炒白芍、肉桂、炙甘草、生薑、大棗
㈡熟地、炙黃耆、酒拌白芍、人參、川芎、當歸
㈢香附、縮砂仁、木香、延胡索、甘草、檳榔、烏藥、生薑
㈣當歸、赤芍、劉寄奴、丹皮、熟地、三稜、莪朮、烏藥、官桂、烏豆、延胡索、生薑

55 下列何者並非虛證閉經的原因？
㈠先天腎氣不足，天癸未充
㈡飲食勞倦，損傷脾氣，化源不足
㈢多產房勞，損及肝腎
㈣經期、產後血室正開，調攝失宜，外感寒邪，內傷生冷

56 《傅青主女科》固本止崩湯最宜治療下列何病證？
㈠氣虛型崩漏　㈡血熱型崩中
㈢肝腎不足型經漏　㈣肝腎虧損型月經先後不定期

57 朱丹溪提出婦人無子的原因，下列敘述何者正確？
㈠冷痰凝滯　㈡子宮虛冷　㈢血少不足以攝精　㈣脾胃虛損

58 下列關於陰挺的敘述，何者錯誤？
㈠陰挺一證相當於子宮脫垂或陰道前後壁膨出
㈡濕熱是引起陰挺之主因，病程綿延久易致氣虛下陷
㈢陰挺與任、帶兩脈失於提攝，前陰肌肉筋脈失養、鬆弛有關
㈣現代醫學將子宮脫垂程度分成三度，子宮頸和部分宮體及陰道前壁全部脫出陰道口屬於第二度

59 某 32 歲女性患者，下腹有堅硬積塊，疼痛拒按，面色晦黯，肌膚甲錯，口乾不欲飲，舌苔薄，脈沉。治以下列何方最適宜？
㈠《金匱要略》大黃蠐螬丸　㈡《金匱要略》桂枝茯苓丸
㈢《蘭室秘藏》散腫潰堅湯　㈣《醫宗金鑑》大七氣湯

60 某 30 歲懷孕已 14 週女性，主訴頭暈，小腹綿綿作痛，按之痛減，無出血，面色萎黃，便稍軟日一行，脈沉滑弱。有關此病例之描述，下列錯誤者共有幾項？①其治療方式之記載始見於《諸病源候論》　②其診斷爲墮胎　③治宜養血緩急止痛
㈠ 0 項　㈡ 1 項　㈢ 2 項　㈣ 3 項

61 關於產後疾病，中醫有「三急」、「三衝」、「三病」之說。三證雖不相同，其共同的主要病機爲何？
㈠氣滯血瘀　㈡亡血傷津　㈢外感六淫　㈣氣虛痰凝

62 根據沈堯封的說法，妊娠病源有三大綱，不包括下列何者？
㈠陰虧　㈡腎虛　㈢痰飲　㈣氣滯

63 下列關於產後乳汁不足之敘述，何者正確？
㈠《傅青主女科》認爲產後缺乳治宜補氣以生血，並加入利竅之藥以通乳
㈡《三因極一病證方論》提到產婦乳脹不行，虛者宜用漏蘆、通草、鯽魚之屬
㈢產後乳汁分泌少，胸脅脹悶，伴有情志抑鬱不樂，飲食不振，舌質正常，苔薄黃，脈弦細而數，宜給予《傅青主女科》通乳丹
㈣產後乳汁不足，屬氣血虛弱者，如一時藥物不便者，可單用豬蹄湯服之

64 下列何者最宜用治虛熱型月經先期？
㈠熟地、黃耆、當歸、白芍、川芎、黨參
㈡黃連、赤芍、川芎、黃芩、當歸、熟地
㈢生地、白芍、元參、地骨皮、阿膠、麥冬
㈣當歸、黃柏、香附、黃連、艾葉、白芍、知母、川芎、阿膠、黃芩

65 有關小兒生理特點，下列何者正確？①傳變迅速　②臟腑嬌嫩　③生機蓬勃　④形氣未充
㈠①②③　㈡①③④　㈢②③④　㈣①②③④

66 在《醫宗金鑑・幼科雜病心法要訣》的記載中，兒自胞胎既脫以後，有因便秘、腹中穢惡不淨，令兒腹滿其吐不止者，宜下列何方？
㈠調胃承氣湯　㈡香蘇飲　㈢一捻金　㈣黃連二陳湯

67 依《醫宗金鑑》，小兒咳嗽的治療，下列敘述何者正確？①肺寒咳嗽證，便軟者用聖惠橘皮散，便秘者用補肺阿膠湯　②肺熱咳嗽證，便軟者用加味瀉白散，便硬者用加味涼膈散　③食積咳嗽證，便溏者用麵麥二陳湯，便秘者用蘇葶滾痰丸　④風寒咳嗽證，便軟者用參蘇飲，便秘者用金沸草散
㈠①②　㈡③④　㈢②③　㈣①④

68 下列何者最不適合用於治療小兒風寒感冒？
㈠麻黃湯　㈡葱豉湯　㈢杏蘇散　㈣荊防敗毒散

69 某 5 歲幼童，因食慾不振至醫院求診，經察其腹部脹滿，手足心熱，噯氣泛酸，大便酸臭，口渴腹熱，喜歡趴睡，但睡不安穩。依《幼科雜病心法》，下列相關敘述，何者最不適宜？
㈠係孩童恣意肥甘生冷，腸胃不能運化所致　㈡此屬「食滯」
㈢可選用木香大安丸消導之　㈣若該孩童便秘重者，則不可攻下

70 某 4 歲幼童，因腹痛 1 天來求診。症見腹部脹滿，按之痛甚，口氣酸臭，不思飲食，時轉矢氣，大便穢臭，瀉後腹痛則減少，夜臥不安，舌苔厚膩。治以下列何方最適宜？
㈠香砂平胃散　㈡養臟散　㈢痛瀉要方　㈣葛根芩連湯

71 有關癇證臨床表現之敘述，下列何者錯誤？①濕癇發作時易喉間痰鳴　②瘀血癇發作時四肢抽搐不甚明顯　③肝熱驚觸癇證可能會吐舌急叫　④風癇發作時仰臥面赤，牙關噤急
㈠①②③　㈡①②④　㈢①③④　㈣②③④

72 有關慢驚風的治法，下列何者正確？①溫中健脾　②溫陽逐寒　③鎮驚　④息風
㈠①②　㈡①③　㈢①④　㈣③④

73 有關小兒水腫，如來勢迅速，水腫由眼瞼開始，繼而四肢，顏面爲甚，皮膚光亮，並有發熱，惡風，咳嗽，治以麻黃連翹赤小豆湯。若兼見咳喘者，宜加下列何者？
㈠羌活、防風　㈡大腹皮、益母草　㈢附子、肉桂　㈣葶藶子、桑白皮

74 在《幼科雜病心法・淋證門》的記載中，「冷氣入胞，小便閉塞脹難禁，淋漓不斷腹隱痛」，宜治以下列何方？
㈠五苓散倍加肉桂、小茴香　㈡十味導赤散
㈢八正散　㈣小薊飲子

75 《醫宗金鑑》之清熱瀉脾散，下列何者爲其組成藥物之一？①石膏　②山梔子　③大黃　④連翹
㈠①②　㈡①③　㈢①②④　㈣②③④

76 夏季熱是嬰幼兒時期的一種特有疾病。關於其臨床發病特徵，下列何者正確？①口渴　②多尿　③多汗
㈠①②　㈡①③　㈢②③　㈣①②③

77 依《醫宗金鑑》，有關小兒衄血的治療。下列敘述何者正確？①傷寒熱鬱於榮，其身無汗，用麻黃湯汗之　②熱盛者，用犀角地黃湯瀉之　③內熱衄血者，用涼膈散清之　④外俱用髮灰散，或黑梔子末吹鼻
㈠①②　㈡①②③④　㈢①②④　㈣①④

78 紫癜反覆發作，日久不癒，下列治法何者正確？
㈠滋養肝腎　㈡益氣攝血　㈢補氣活血　㈣補益氣血

79 依《醫宗金鑑・痘疹心法》，疹毒熱甚上攻喉，疹毒聲啞肺熱壅，元參升麻大有功。若疹已發而失音者，以下列何方治療？
㈠鼠黏子湯　㈡桔梗湯　㈢加味涼膈散　㈣響聲破笛湯

80 有關小兒嘔吐，下列敘述何者正確？①小兒哺乳後，乳汁自口角溢出，稱爲「溢乳」　②「溢乳」多屬病態，宜注意改善哺乳方法　③乳兒傷乳而吐者，又稱「哯乳」　④溢乳嚴重，應考慮「胃食道回流」的可能
㈠①②③　㈡①③④　㈢②③④　㈣①②③④