114年第二次專技高考醫師中醫師第一階段考試、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、114年專技高考職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試

代　　號：4310
類科名稱：助產師
科目名稱：助產學（一）（包括助產學緒論、生殖系統的解剖與生理、產前護理、分娩期護理、產後護理、新生兒護理）
考試時間：1小時　　座號：_____

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.有關我國產科照護的趨勢，下列敘述何者錯誤？

A.衛生福利部曾規劃「友善多元溫柔生產醫院試辦計畫」以鼓勵助產師重返醫院

B.衛生福利部已明確規範陪產員之服務範疇

C.助產師提供婦女橫跨產前、產時與產後的持續性照護

D.助產人員業務範圍包含嬰兒保健指導

2.以家庭為中心的照護概念，下列敘述何者錯誤？

A.鼓勵家人參與孕育與出生歷程

B.建議醫療機構建置制式化生產空間以利監控

C.導入生產計畫書促使孕產婦參與生產決策

D.尊重母親意願實施親子同室

3.助產師對孕婦所提出「水中生產」的問題進行說明與分析，主要是屬於下列何種專業角色功能？

A.照顧者

B.諮詢者

C.支持者

D.管理者

4.有關乳房的敘述，下列何者正確？①腺體組織以乳房外上1/4處為最多　②乳房其下方為胸大肌與前鋸肌，並延伸至腋下　③輸乳管的開口位於乳暈　④乳暈上含有皮脂腺，其分泌物能保護乳頭

A.①②③

B.①②④

C.僅①③

D.僅②④

5.有關排卵前雌性素分泌達高峰時，腦下垂體前葉激素之變化，下列何者正確？

A.抑制FSH分泌，促進LH生成

B.抑制LH分泌，促進FSH生成

C.促進FSH與LH生成

D.抑制FSH與LH分泌

6.月經規則36天來潮一次，排卵約發生在月經週期第幾天？

A.13～14天

B.15～16天

C.18～20天

D.21～22天

7.骨盆的髖骨由三塊骨融合而成，下列何者錯誤？

A.髂骨

B.坐骨

C.尾骨

D.恥骨

8.妊娠37週的初產婦，在產檢時表示自己因肚子變大，日常活動變得不靈活、不方便，詢問助產師應該要如何調整。有關孕婦日常活動的建議，下列敘述何者錯誤？

A.站立時小腹及臀部應用力縮緊，雙肩後傾伸展背部肌肉

B.由椅子站起時，應先踏出一隻腳，並將重心擺在後腳

C.提重物時應先將雙腳打開與肩同寬，慢慢蹲下後再將物品提起

D.若需久站時，可將雙腳打開，一隻腳略往前，以減少背部緊張度

9.有關懷孕用藥分級之內容敘述，下列何者錯誤？

A.A類：經孕婦對照試驗，於整個懷孕期間該藥物對胎兒無害

B.B類：動物生殖試驗顯示未能證實對胎兒有害，未進行孕婦對照試驗

C.C類：動物生殖研究顯示對胎兒有不良反應，但未對孕婦進行對照試驗

D.D類：人體對照試驗對胎兒有害，若孕婦情況危急、無替代藥品可使用

10.馮女士，妊娠37^{+3}週，產檢時主訴：「預產期快到了，有點緊張，我不曉得生產時要準備什麼，也不知道應該要注意什麼，可以給我一些建議嗎？」，下列何者不適當？

A.指導認識產兆，如子宮規則收縮、現血等

B.為補充體力，鼓勵待產時進食少量、重口味的食物

C.準備孕婦個人用品，如衛生棉、哺乳胸罩、開前襟之衣服等

D.準備生產球、按摩球、護唇膏等物品，以緩解待產不適

11.蔣女士懷孕26週，主訴肛門有腫脹、搔癢感，發現有痔瘡，下列護理措施何者不適當？

A.每天飲水量至少1,500～2,000 c.c.

B.建議多攝取全穀類、蔬果、海藻類等食物

C.進行骨盆底肌肉運動，每天做5～10回，每回10次

D.局部使用冰塊冰敷，每次25～30分鐘

12.有關待產期伴侶協助待產婦女的舒適措施，下列何者不適當？

A.穴位按摩緩解產痛

B.儘量於床上，以促進休息避免跌倒

C.下腹部熱敷促進鬆弛及舒適

D.握住待產婦女的手給予支持

13.下列何者不符合親善生產（mother friendly childbirth intiative）的概念？

A.減少使用持續性胎心音監測

B.使母親及新生兒與適當的社區資源產生聯繫

C.鼓勵撫觸、擁抱、哺餵母乳，排除先天異常嬰兒

D.自由選擇分娩姿勢，除非發生併發症

14.張女士，妊娠36週，產前門診應該要安排下列何項檢查？

A.母血唐氏症篩檢

B.乙型鏈球菌篩檢

C.B型肝炎篩檢

D.人類免疫缺乏病毒篩檢

15.有關胎兒生理活動評估（BPP）報告中，下列何者為異常表現？

A.30分鐘內，觀察到胎兒的呼吸運動持續30秒以上

B.30分鐘內，觀察到胎兒的連續性身體運動有4次

C.超音波顯示，最大羊水囊的直徑大於1公分

D.無壓力試驗30分鐘內，有3次胎動，其中1次胎心加速20次／分，維持20秒

16.張女士，30歲，下列孕期相關檢查結果中，何者最需進一步追蹤？

A.胎兒生理活動評估（BPP），8分

B.無壓力試驗（NST），反應型

C.唐氏症母血篩檢，風險值1/110

D.平均紅血球體積（MCV），88 fL

17.有關懷孕期對婦女皮膚系統之影響，下列敘述何者正確？

A.雌性素及黃體素分泌增加，刺激腦下垂體中葉分泌黑色素細胞刺激素，加深皮膚的色素沉著

B.汗腺與皮脂腺分泌旺盛，此為雌性素及孕期體重增加所致

C.在頭頸胸和腿部，出現呈身體中心向外放射狀分布的小紅點，此為黃體素所致

D.第三孕期在乳房、大腿和腹部皮膚上，出現波浪狀、凹陷、紅紫色的條紋，此為血管增生所致

18.新生命的來臨將改變家庭中原有的生活型態和互動情形，可能會導致角色衝突。下列敘述何者為角色間（between role）的衝突？

A.擔心懷孕後無法兼顧工作，而掙扎是否將工作辭掉以專心生產

B.擔心自己沒有辦法成為丈夫或婆婆所期待的好媽媽角色

C.擔心自己沒能力同時照顧大寶及即將到來的新生兒

D.擔心懷孕後身材改變，影響與丈夫間原有的親密關係

19.一位足月陰道產婦女，產後各系統產生之影響，下列何者屬於不可逆性變化？

A.子宮頸外口形狀

B.脊柱腰椎向前彎

C.頭髮毛囊數目減少

D.黑色素沉著

20.下列何種激素會刺激睪丸間質細胞分泌睪固酮？

A.腎上腺皮質素（ACTH）

B.濾泡刺激素（FSH）

C.黃體生成素（LH）

D.生長激素（GH）

21.懷孕中的王女士詢問，何時可以用聽診器讓大寶從腹部聽二寶的心音？

A.懷孕8週

B.懷孕12週

C.懷孕15週

D.懷孕19週

22.李女士，月經已過期2週，下列檢查何者為最快確定懷孕？

A.血液，黃體素（progesterone）濃度上升

B.尿液，黃體生成素（LH）濃度下降

C.血液，人類絨毛膜促性腺激素（hCG）上升

D.尿液，濾泡刺激素（FSH）下降

23.林女士懷孕4個月，大女兒8歲，有關促使大女兒接受新生兒的方法，下列何者最不適當？

A.大女兒還無法想像胎兒的樣子，利用影帶協助女兒了解生產過程

B.替大女兒多安排安親班課程，以使有時間準備生產及坐月子

C.透過說故事比喻方式說明生產過程，並讓大女兒共同參與新生兒相關事務

D.讓大女兒協助母親，參與生產準備活動，並交代任務促進認同感

24.承上題，下列何者最有可能是8歲大女兒的正常心理發展反應？

A.「我不要媽媽生小弟弟（大哭）」

B.「什麼時候天使才會將弟弟送到我們家？」

C.「好期待弟弟出生啊，我會幫忙照顧他的！」

D.「弟弟比我小8歲，差好多，好尷尬哦！」

25.下列那個荷爾蒙可以鬆弛平滑肌、抑制子宮收縮，又稱為助孕酮？

A.雌性素（estrogen）

B.黃體素（progesterone）

C.催產素（oxytocin）

D.泌乳素（prolactin）

26.有關妊娠期呼吸系統的變化，下列敘述何者正確？

A.母體呼吸中樞對二氧化碳的敏感度增加，是因雌性素上升所致

B.潮氣容量會隨妊娠週數而逐漸降低，比未懷孕時約減少30～50%

C.因子宮擴大，橫膈膜向上升，而使得功能肺餘容量下降

D.懷孕後黃體素濃度升高，造成鼻黏膜水腫和充血

27.張女士，40歲，第二孕期，體重已增加8 kg，為國小老師，詢問為何她孕前沒有靜脈曲張，但孕期卻發生下肢靜脈曲張。下列回應何者最不適當？

A.孕期體重增加太多

B.從事久坐或久站的工作

C.最常發生於第一孕期發生

D.易發生於高齡孕婦

28.曾女士懷孕40週，待產中，腹部四段式觸診發現，胎兒為頭產式，但腹部的肚臍及其下方凹陷，且個案主訴胎動在腹中線最明顯。其胎心音最大搏動點會位於母體腹部的那個部位？

A.肚臍下方周圍

B.肚臍和髂骨前上棘連線中間

C.髂骨前上棘和肚臍的延長線上

D.左右側腰區

29.有關產程進展之評估結果，下列何者需要醫療介入？

A.初產婦規律陣痛持續14小時仍處潛伏期

B.破水後12小時未進入產程

C.現血後12小時未進入產程

D.懷孕36週出現間歇性子宮收縮

30.有關待產婦的生理反應，下列敘述何者正確？

A.白血球數值高達25,000/mm^3，表示有感染

B.因應生產能量消耗，腸胃蠕動和吸收作用會增加

C.在第一產程，血壓會上升，心跳速率會下降

D.子宮肌肉因收縮產生耗損，尿蛋白2+ 屬正常

31.有關胎兒先露部位下降高度（station），下列敘述何者正確？

A.浮動（floating）表示先露部分已經逐漸下降，並達到骨盆入口

B.固定（engagement）表示胎頭到達坐骨棘連線，此時觀察會陰可見明顯胎頭外露

C.沉降（dipping）表示先露部分未完全進入骨盆入口，胎頭高度較浮動（floating）高

D.station +4表示胎頭的先露部分在坐骨棘線連線下4公分，會陰膨出

32.當胎頭雙頂徑著冠於陰道口，子宮收縮時不會退回陰道內，此時分娩機轉，下列何者最適當？

A.伸展

B.排出

C.屈曲

D.內回轉

33.有關第二產程教導待產婦用力方式，下列何者最適當？

A.當產婦想用力時，引導閉氣用力

B.當產婦有不自主用力感覺，引導聲門發出聲音方式用力

C.當產婦大叫想用力時，教導連續吸氣多次，再吐氣

D.產婦想用力就用力，不必配合宮縮，自行調控呼吸頻率

34.產婦剛完成第二產程，下列何者徵象顯示胎盤剝離且即將娩出？

A.子宮底高度下降

B.陰道口收縮

C.子宮頸口全開

D.陰道口外膪帶變長

35.有關運用認知法緩解待產不適之非藥物性止痛方式，下列何者錯誤？

A.生產教育

B.呼吸技巧

C.催眠法

D.正念療法

36.低風險產婦陰道生產娩出胎兒後，下列何者為最優先採取的措施？

A.協助娩出胎盤

B.協助母嬰肌膚接觸

C.衛教子宮按摩方式

D.計算生產出血量

37.陳女士第三孕期，主訴害怕生產過程疼痛，故參加生產教育課程，以認識產痛來源與減少負向感受，主要依據下列那項產痛理論？

A.門閥控制理論

B.制約學習理論

C.神經傳導制約理論

D.害怕、緊張疼痛循環理論

38.有關WHO（2018）針對低風險待產婦獲得正向生產經驗之建議照護措施，下列何者最適當？①開始呼吸且羊水清澈之新生兒，不進行口鼻黏液抽吸　②延遲斷臍　③每兩小時進行陰道內診　④常規會陰切開術

A.①②③

B.僅①②

C.僅③④

D.②③④

39.有關分娩開始前的徵兆，下列敘述何者正確？

A.經產婦因有生產經驗，故腹輕感會比初產婦更加明顯

B.在排出子宮頸黏液塞的72小時後，會啟動分娩

C.分娩前1～7天，因黃體素上升使婦女感到精力充沛，出現築巢行為

D.產前破水（PROM）後的24～48小時內通常會啟動分娩

40.有關破水個案的檢驗，下列敘述何者正確？①使用nitrazine試紙，顏色會變成黃綠色　②使用nitrazine試紙，顏色會變成藍色　③Actim PROM檢測較不容易受血液精液影響結果　④ 使用Actim PROM試劑具高敏感度但低特異性

A.①③

B.②④

C.①④

D.②③

41.有關拉梅茲國際組織之促進正常分娩的六大護理準則內容，下列何者不適當？

A.由醫療人員引發產程開始

B.待產時可以自由下床走動及改變姿勢

C.持續性的產程支持

D.無例行性醫療常規介入措施

42.有關婦女於待產時浸泡於溫水中或淋浴的好處，下列敘述何者不適當？

A.血管擴張

B.肌肉放鬆

C.緩解疼痛

D.降低腦內啡（endorphins）

43.新生兒與產婦於產後進行立即性的肌膚接觸時，下列照護措施何者最不適當？

A.幫助產婦採取舒適姿勢

B.將新生兒放在產婦胸腹處

C.將新生兒的嘴打開含住產婦乳頭並吸吮

D.適當覆蓋新生兒以防體溫喪失

44.陳女士因不規則性子宮收縮與有水狀分泌物流出而來醫院檢查，以石蕊試紙檢測陳女士陰道流出之液體，若已破水，則會呈現下列何種反應？

A.酸性反應，試紙呈黃綠色

B.鹼性反應，試紙呈藍色

C.中性反應，試紙呈粉紅色

D.陰性反應，試紙呈橄欖綠色

45.吳女士於產房平安產下一男嬰，聽到小孩宏亮的哭聲時向助產師要求讓她抱小孩，下列處置何者最適當？

A.告訴吳女士要問過兒科醫生的意見再決定

B.儘快執行母嬰肌膚接觸

C.新生兒出生的前30分鐘是不穩定期，不合適跟媽媽接觸

D.出生的新生兒是無菌的，所以必須換無菌衣再抱小孩

46.產婦子宮頸口全開，身心狀況穩定，但沒有明顯想用力的衝動（urge to push），下列處置何者最

優先？

A.鼓勵產婦開始閉氣用力，促進產程進展

B.協助產婦改變姿勢，促進產程進展

C.使用催產素促進產程進展

D.採人工破水促進產程進展

47.經產婦或腹直肌張力較差的產婦，易有腹部下墜造成胎兒重心遠離骨盆，於待產期間宜教導產婦擺何種姿位以促進產程？

A.半坐臥式

B.站姿前傾姿勢

C.膝胸臥式

D.蹲姿

48.有關低風險的待產婦，於子宮頸口擴張4公分後，長達2小時未有進展時，此時最適宜的措施為何？

A.人工破水加速產程

B.採硬膜外麻醉以利產婦休息

C.改變產婦姿勢以促進產程

D.告知產婦因產程遲緩需禁食

49.有關第二產程產程進展之評估，下列敘述何者正確？①觀察婦女的行為反應　②第二產程應以兩小時為限　③每15分鐘內診評估子宮頸口變薄與擴張　④評估子宮收縮頻率、強度與持續時間　⑤評估胎頭先露部位

A.①④⑤

B.②③④

C.①②③

D.③④⑤

50.有關母乳哺育好處之敘述，下列何者不適當？

A.母乳具物種專一性；若使用成分未調整的羊奶餵食嬰兒，易引起葉酸缺少性貧血

B.母乳成分會依新生兒需求調整；若使用牛奶基質之配方奶餵食嬰兒，易引起肥胖

C.因母乳中不含膽固醇，可有效預防成年後血中膽固醇量增高

D.當母親接觸到病原時，可產生病原專一性抗體，透過母乳使嬰兒得到保護

51.王女士，凌晨03：33陰道分娩一正常男嬰，早上5點返回病室並採親子同室，王女士詢問目前可以做甚麼以確保順利哺乳。下列建議何者最適當？

A.生產耗損大量體力，等母嬰都恢復元氣後再嘗試哺乳

B.進行乳房泌乳量評估，若泌乳情況良好再鼓勵嘗試哺乳

C.建議母嬰作息一致，嬰兒想吃時餵奶，嬰兒想睡時放回小床睡覺

D.衛教第一天嬰兒只需極少量母奶，不要滿足新生兒一直討奶而干擾母親的作息

52.張女士，初產婦，因產程延長而剖腹生產，產後第2天表示尚未有奶水分泌，擔心無法持續哺乳。下列回應何者最適當？

A.說明因產程延長及剖腹生產可能使乳汁大量分泌的時程延後

B.說明產後頭2天泌乳量很少，用電動擠奶器擠乳，效果較佳

C.鼓勵在身體舒適情況下，儘量多哺乳，增加對乳房的刺激，以促進泌乳啟動

D.告知勿擔心，明後天乳房會開始大量泌乳，甚至會出現生理性脹奶

53.產後第1天的王女士，G_1P_1，相當擔心分泌的奶量少，無法滿足新生兒營養與成長需求，下列回應何者最適當？

A.通常新生兒的胃很小吃的奶量少，睡眠比較重要，所以不需要緊張

B.不用擔心，如果新生兒體重降低超過10%，醫院會主動給予額外的乳汁補充營養

C.注意觀察新生兒吸吮的時間，如果吃奶時間非常長，就意味母親奶水分泌不足

D.我理解你的擔心，可觀察新生兒的大小便、體重變化及活力來評估攝取的奶量是否足夠

54.王女士採剖腹生產，想瞭解適合的餵奶姿勢，下列回應何者最不適當？

A.只要自己舒服的姿勢都可以嘗試，例如坐著、平躺或側臥

B.建議優先嘗試新生兒側趴在媽媽身上的嬰兒引導式（baby-led）哺乳姿勢

C.不論採用何種姿勢，應先徵詢醫師意見，以免影響手術傷口復舊

D.各種哺乳姿勢都要確保母嬰身體緊貼，嬰兒身體受到支托的原則

55.產後2天，這位哺乳媽媽第一次嘗試採側躺哺乳，下列敘述何者最不適當？

A.建議媽媽身體背後可以枕頭支撐，有助於排乳

B.哺乳時母嬰眼神的情感交流，可以激活荷爾蒙效益

C.建議媽媽在腰際及雙腿中間放置枕頭支撐，避免痠痛而抑制排乳

D.建議媽媽餵奶時持續以左手托住乳房，以利嬰兒正確吸乳

56.產後婦女執行凱格爾氏運動的目的，下列何者錯誤？

A.預防壓力性尿失禁

B.改善血栓靜脈炎

C.促進會陰部血液循環

D.預防子宮脫垂

57.產後情緒低落（postpartum blue）的敘述，下列何者錯誤？

A.盛行率約30～80%

B.主要是因為荷爾蒙濃度的變化

C.產後第10天是情緒低落達最明顯

D.通常產後會自行復原

58.有關親子依附關係（attachment）之敘述，下列何者最不適當？

A.親子同室可促進親子依附關係

B.餵母乳可促進親子依附關係

C.生產後才開始產生依附關係

D.鼓勵較大孩子探視產後母親

59.李女士產後第4天，積極詢問有關育嬰方面的問題。根據魯賓（Rubin）的母性行為表現理論，李女士處於下列那期？

A.嘗試期（trying-on phase）

B.接受期（taking-in phase）

C.執行期（taking-hold phase）

D.釋放期（letting-go phase）

60.有關手擠乳對奶量的影響，下列敘述何者不適當？

A.儘可能嘗試親自哺乳，無法親餵時以手擠乳杯餵，有助於維持泌乳量

B.產後第1週在身體許可情況下，頻繁手擠乳可以促進泌乳量

C.手擠乳比電動擠乳器更能改善局部乳房阻塞情況

D.手擠乳杯餵比親餵更能確保嬰兒得到足夠的奶水量

61.有關哺乳與月經的敘述，下列何者正確？

A.純母乳哺餵的產婦平均約於產後6週便會有第1次月經來潮

B.血中的泌乳素（prolactin）會抑制排卵，因此哺乳婦女會持續不孕

C.在哺餵母乳期間無月經即代表沒有排卵

D.哺餵母乳期間的長短會影響到哺乳婦女的排卵及月經

62.為增進產婦之產後心理調適，下列那項護理措施最不適當？

A.提醒伴侶儘量不打擾產婦，使其獲得充分的休息

B.鼓勵產婦與他人分享分娩經驗

C.了解產婦對家人的支持期待

D.適時的澄清與同理產婦的感受

63.有關母乳成分敘述，下列何者錯誤？

A.初乳的熱量較高，內含礦物質、乳糖及少量脂肪

B.前奶（foremilk）富含蛋白質、乳糖，水分的含量少

C.過渡乳和成熟乳的脂肪含量會逐漸增高，蛋白質及無機鹽含量比例逐漸減少

D.後奶（hindmilk）富含脂肪，故熱量較前奶高

64.有關婦女於妊娠期及產後初期之乳房生理變化，下列敘述何者錯誤？

A.泌乳素（prolactin）促進乳腺上皮細胞增殖以及乳汁形成

B.催產素（oxytocin）作用在乳腺泡肌皮細胞，將乳汁由乳腺管腔擠壓出來

C.神經內分泌反射（neurohormonal reflex）可使乳汁經由乳腺管排出

D.黃體素（progesterone）促進乳腺管的增生；雌性素（estrogen）則刺激乳腺泡之發育

65.有關產後婦女生理變化之敘述，下列何者正確？

A.產後初期為利尿期，可將身體組織囤積過多的液體排出體外

B.產程延長者，產後體溫會有上升現象，會超過38℃，但不會超過3天

C.剛生產完後，脈搏速率增快，約為100次／分，產後7～10天恢復正常

D.產婦產後初期因腹內壓減輕，腹肌鬆弛使得腸蠕動增快，容易腹瀉

66.有關陰道分娩後，預防發生姿勢性低血壓的護理措施，下列何者最不適當？

A.事先評估產婦的產後出血情形

B.第一次下床活動應有陪伴者

C.採漸進式改變姿勢下床

D.產後24小時內臥床休息，勿下床

67.有關性交後避孕藥或緊急避孕藥的使用，下列敘述何者正確？

A.必須於性行為發生後24小時內使用才有效

B.緊急避孕藥如果是兩劑，每劑使用間隔是6小時

C.緊急避孕藥常合併嚴重嘔吐的副作用，服用前可先使用止吐藥

D.使用緊急避孕藥若仍懷孕，則藥物很有可能會影響胎兒，不建議保留胎兒

68.有關新生兒出生後施打維生素K_1的敘述，下列何者正確？

A.先執行維生素K_1注射後，再執行親子肌膚接觸

B.新生兒維生素K_1不足，會造成體內凝血因子缺乏

C.給與注射維生素K_1 10 mg，以催化肝臟合成凝血因子

D.採皮下注射，部位為大腿的股四頭肌中段的外側

69.有關正常新生兒免疫系統之相關敘述，下列何者錯誤？

A.妊娠20週後，胎兒能自行合成少量的IgE、IgG、IgM免疫球蛋白

B.IgE是唯一可以通過胎盤的抗體，主要是由母體而來

C.新生兒無法自行合成IgA，可由哺餵初乳而獲得

D.當新生兒的IgM值升高，顯示有子宮內感染

70.王小弟，足月兒，其母親表示自己為葡萄糖-6-磷酸去氫酶缺乏症（glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency,G6PD）帶因者，但先生沒有G6PD家族史。在助產師幫王小弟完成先天代謝異常篩檢採血後，王媽媽便很焦慮地詢問：「新生兒篩檢結果何時出來？若是結果不好怎麼辦？」下列助產師的回應何者較為適當？

A.媽媽別擔心，新生兒篩檢結果只是參考，若是結果不好我們這裡可以安排幫您跟寶寶多驗幾次

B.媽媽您別太緊張，篩檢都會有偽陽性或陽性的機會，王小弟看起來很健康，結果應該是正常

C.媽媽您的擔心我們能理解，若初篩結果為偽陽性或陽性，我們都會再通知您與寶寶回診複檢

D.媽媽您的擔心是有道理的，王小弟有75%的機會遺傳到G6PD，我們會協助您轉介門診諮詢

71.依照臺灣目前的疫苗施打建議期程，下列何項公費疫苗不會在新生兒出生三個月內接種？

A.B型肝炎疫苗第一劑

B.B型肝炎疫苗第二劑

C.卡介苗

D.五合一疫苗第一劑

72.某新生兒出生後曾接受輸血治療，目前無特殊合併症與生命徵象穩定。需採血進行新生兒篩檢，其最適當的採血時間為何？

A.輸血3日後且哺乳滿24小時後

B.輸血7日後且哺乳滿24小時後

C.輸血3日後且體重大於2,500公克

D.輸血7日後且體重大於2,500公克

73.林小弟為健康的足月兒，出院返家後1週，臍帶還沒脫落，其父因擔心有異常，故來電詢問，電話中描述其臍帶外觀乾燥，肚臍也沒有發紅、出血或流出有臭味的液體。下列回應何者最適當？

A.臍帶狀況是正常的，若是已完全乾燥可嘗試移除

B.建議於每次沐浴後，繼續觀察是否紅腫與分泌物

C.建議回門診就醫，因為一般臍帶在出生5天內就應脫落

D.建議使用95%酒精棉片包紮乾燥的臍帶使其儘早脫落

74.有關出生39週正常新生兒的生理成熟度之特徵，下列敘述何者正確？

A.皮下脂肪少、皮膚薄而透明，可見血管

B.足底前1/3有皺褶，且皺摺深

C.耳朵軟骨組織較少，無回彈性

D.較多的胎毛，尤其背部、臉頰

75.健康足月兒之母親，詢問有關出外旅遊時母奶的保存方式，下列回應何者最適當？

A.新鮮剛擠出之奶水可置於室溫（25℃）中存放12小時

B.攜帶冷藏奶如果沒喝完，可放回冰桶中存放6小時

C.新鮮奶水置於冰寶維持的絕緣冰桶中，可存放24小時

D.可將冷凍奶直接加熱解凍

76.有關新生兒之出生後使用眼藥膏進行眼睛護理，下列敘述何者錯誤？

A.通常使用四環黴素或紅黴素藥膏

B.出生6～8小時內使用眼藥膏才具有預防感染之效果

C.預防淋病性結膜炎

D.沿著眼睛的下結膜由內眥往外眥塗

77.有關使用Apgar Scores評估新生兒之敘述，下列何者錯誤？

A.評估時間為新生兒出生第1分鐘和第5分鐘

B.了解新生兒身體狀況及是否須進行心肺復甦術

C.包括心跳速率、呼吸能力、皮膚顏色、肌肉張力、反射性的刺激反應

D.評估結果為7分者，代表需要立即給與氧氣

78.正常新生兒的心跳與呼吸速率範圍為何？

A.心跳140～180次／分，呼吸60～80次／分

B.心跳120～160次／分，呼吸30～60次／分

C.心跳80～120次／分，呼吸20～40次／分

D.心跳60～90次／分，呼吸16～24次／分

79.新生兒出生後應立即擦乾其身上的羊水，目的是預防下列何種體熱散失途徑的影響？

A.蒸發

B.傳導

C.對流

D.輻射

80.產婦進行「居家生產」時，1小時內3次血壓明顯高於正常值，助產師評估產婦及胎兒健康後立即聯絡醫師，並建議產婦及家人至醫院生產，依據醫療倫理的原則，下列何者最適當？

A.隱私權

B.自主原則

C.公平正義原則

D.不傷害原則