衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：進階專科護理（共同）

題號	1
題目	李先生罹患糖尿病多年，血糖一直控制不良，導致腎臟功能不全，疲憊、肌肉虛弱，心電圖呈現 QT 間隔延長，最可能是下列哪一種電解質失調？ (A) 鈉　(B) 鉀　(C) 鎂　(D) 鈣
公告答案	B
會議決議	(A)鈉不足會脫水 (B)鉀不足會虛弱且 QT 延長 (C)鎂不足會有不整脈或抽蓄 (D)鈣不足會引起 QRS 波變寬，鈣與鉀都會出現以上現象 出處：田豐銘（譯）（2015）. 華盛頓內科學手冊(第三十四版).（原作者：H. Godara, A. Hirbe, M. Nassif, H. Otepka, & A. Rosenstock）. 臺北市:合記。（原著出版年：2013）p73 表 2-7
確認答案	B、D

衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：進階專科護理（共同）

題號	3
題目	王先生因意識不清楚而入院，抽血檢查如下：Na^+120mEq/L、K^+3.6mEq/L、Ca^+13mg/dL，下列那些處置最適當？ ①0.9% saline 靜脈注射②給予 calcium carbonate③補充氯化鉀④給予 thiazides 類利尿劑 (A) ①② (B) ①④ (C) ②③ (D) ③④
公告答案	B
會議決議	Na^+120mEq/L 為中度低血鈉、K^+3.6mEq/L 鉀正常、Ca^+13mg/dL 為高血鈣。給予 IV0.9%saline 可提升鈉，calciumcarbonate 是用於低血鈣的治療鉀正常不需補充氯化鉀，高血鈣給予 thiazides 類利尿劑和 saline 可促進鈣離子排出，故答案為 B。因 thiazides 類利尿劑為高血鈣 Loop 類利尿劑，於此狀況之處置較不適當，故此題無正確答案。 出處： Jameson J. L., Fauci A. et al.（20118）。Harrison's Principles of Internal Medicine（20th）：Chapter 50
確認答案	送分

衛生福利部 109 年度內(外)科專科護理師甄審

【筆試甄審】疑義試題答案公告說明

科目：進階專科護理（兒科組）

題號	47
題目	關於法洛氏四重症(Tetralogy of Fallot)嬰兒出現高度發紺(hypoxic spells)時，下列處置何者最不適當？ (A) 給予復甦姿勢(recovery posture) (B) 給予氧氣(oxygen support) (C) 注射 morphine 以減少過度換氣 (D) 注射 propranolol 以減緩心跳
公告答案	D
會議決議	(A)給予復甦姿勢(recovery posture)對高度發紺幫助不大，應擺成 knee-chest position，可增加 SVR、讓血留在下肢，暫時減少全身回心血流，此外亦可使嬰兒可以被安撫下來減少耗氧 (B)給予氧氣以改善氧合 (C)給予 Morphine 藥物注射: 抑制呼吸中樞及減少過度換氣 (D)注射 propranolol 可減緩心跳，減少耗氧，並增加回心血流 出處： Nelson Textbook of Pediatrics (2020), 21th edition. p. 2396-2400.
確認答案	A