行政院衛生署
102 年內(外)科專科護理師甄審筆試

准考證號碼：□□□□□□

(請考生自行填寫)

進階專科護理
外科(婦產科組)

公告試題 僅供參考

【注　意　事　項】

1.請核對考試科目與報考類(組)別是否相符。

2.請檢查答案卡、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。

3.本試卷共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣。

4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。

5.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。

6.請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試卷」一併繳回。

7.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。

1. 老年病人服用下列何種藥物時，於一般劑量下會引起譫妄(delirium)副作用的機率較小？
(A) anticholinergics (B) acetaminophen (C) acyclovir (D) opioids

2. 下列何者是「過敏性休克」發生時的首選升壓或強心藥物？
(A) epinephrine (B) dopamine (C) vasopressin (D) norepinephrine

3. Amoxicillin-clavulanic acid(Augmentin®)是哪一類的抗生素？
(A) cephalolosporins (B) quinolone (C) penicillins (D) aminoglycosides

4. 依據 Early Goal Direct Therapy 輸液原則為敗血症休克病人進行輸液，下列何者不符合其輸液治療的目標？
(A) 維持中央靜脈壓(CVP 值)在 8–12 mmHg
(B) 維持中央靜脈血氧飽和度($S\bar{v}O_2$)低於 70%
(C) 維持尿液量每小時每公斤體重至少 0.5 毫升以上
(D) 平均動脈壓高於 65 mmHg

5. 下列哪些細菌容易造成院內感染肺炎？
1.*Enterococus facium* 2.*Group A Streptococcus*
3.*Pseudomonas aeruginosa* 4.*Acinetobacter baumannii*
(A) 1、2 (B) 3、4 (C) 1、3 (D) 2、4

6. 女性 86 歲，近日來嗜睡，今早叫不醒，被送至急診室。家屬表示約 3 週前曾經跌倒，頭部雖有撞到傢俱，但無明顯外傷。目前腦部電腦斷層檢查結果如下圖，病人最可能的診斷為何？
(A) 腦內出血
(B) 硬腦膜上血腫
(C) 硬腦膜下血腫
(D) 蜘蛛網膜下腔出血



7. 李女士 55 歲，於半年前開始偶爾於半夜間因胸悶而驚醒，最近一週復發一次。接受 24 小時心電圖檢查，發現其於睡眠時有胸悶發作，此時心電圖出現 ST 波段上昇。最可能之診斷為何？
(A) 穩定型心絞痛 (B) 不穩定型心絞痛 (C) 變異型心絞痛 (D) 非典型心絞痛

8. 乳癌病人左乳具 6×11 公分有嚴重臭味的腫瘤蕈狀傷口，使用下列何種敷料最適合？
(A) 濕性敷料(wet dressing)
(B) 透明凝膠(hydrogels)
(C) 乾紗(dry gauze)
(D) 含銀的抗菌敷料(antimicrobial dressing)

9. 添加下列何種胺基酸，可以促進病人黏膜潰瘍之修復？
(A) 異白胺酸(isoleucine) (B) 丙胺酸(alanine)
(C) 麩醯胺酸(glutamine) (D) 離胺酸(lysine)

10. 針對較深的壓瘡傷口應選擇下列何種敷料以達到較好填補效果？
(A) 膠體敷料(hydrocolloids) (B) 海藻酸鈉敷料(alginates)
(C) 泡沫狀敷料(foam dressing) (D) 透明敷料(transparent dressing)

公告試題 僅供參考

11. 依據中華民國糖尿病學會之建議，下列何者尚不須做糖尿病和糖尿病前期的篩檢？
(A) BMI 為 26 kg/m^2 之 28 歲女性，且去年生產嬰兒重達 4500 公克
(B) BMI 為 24 kg/m^2 之 26 歲女性，且被診斷為多囊泡卵巢症
(C) BMI 為 25 kg/m^2 之 32 歲男性，辦公室工作，此外無其他糖尿病風險因子
(D) BMI 為 25 kg/m^2 之 23 歲大學生，且父母皆有第 2 型糖尿病

12. 下列何者不是台灣地區代謝症候群診斷條件之一？
(A) 三酸甘油脂 (TG) > 150 mg/dL
(B) BMI > 24 kg/m^2
(C) 血壓 > 130/85 mmHg
(D) 腰圍：男性 > 90 公分，女性 > 80 公分

13. 關於低血糖之處理，下列何者錯誤？
(A) 懷疑低血糖時，應立即檢測血糖以確定診斷
(B) 意識清楚的低血糖病人，給予口服醣類 15–20g，例如：葡萄糖片 (粉)、方糖、含糖飲料
(C) 意識不清的低血糖病人，給予靜脈注射 50%的葡萄糖 20 – 50 ml 或肌肉注射升糖素 0.5 – 1.0 mg
(D) 對於低血糖症狀不自覺的病人，血糖控制標準需更嚴格

14. 下列何者非甲狀腺機能低下常見之臨床表徵？
(A) 皮膚濕熱
(B) 月經量過多
(C) 心搏過緩
(D) 聲音嘶啞

15. 王小姐 35 歲，抽血結果發現 alpha fetoprotein 數值高於正常值，除肝癌及急性肝細胞壞死外，仍需進一步考慮下列哪些疾病？
1.懷孕　2.脂肪肝　3.胰臟癌　4.germ cell tumor
(A) 1、2
(B) 2、3
(C) 3、4
(D) 1、4

16. 林小姐 35 歲，抽血結果發現 CA-125 數值高於正常值，下列何者最不可能是下一步評估的方向？
(A) 是否懷孕
(B) 是否有卵巢癌
(C) 是否有腹膜炎
(D) 是否有乳癌

17. 感染 human papilloma virus (HPV) 可能會增加下列何種癌症的風險？
1.乳癌　2.子宮頸癌　3. 鼻咽癌　4.大腸癌
(A) 1、2
(B) 1、3
(C) 2、3
(D) 3、4

18. 下列何者不是國民健康局對癌症篩檢之建議？
(A) B 型肝炎帶原之病人，建議定期進行腹部超音波檢查
(B) 當發現糞便有潛血反應，建議進行大腸鏡檢查
(C) 乳癌之篩檢建議進行 *BRCA1* 之基因檢測，以利早期發現
(D) 30 歲以上婦女建議進行子宮頸抹片檢查，以利子宮頸癌早期發現

19. 病人左側鎖骨下出現淋巴節腫大情形 (又稱為 Virchow's node)， 應優先考慮下列何種疾病？
(A) 鼻咽癌
(B) 肺癌
(C) 淋巴癌
(D) 胃癌

20. 下列神經學檢查發現，何者非第五腰椎神經根病變所導致？
(A) 臀部痠痛並放射到大腿後外側、小腿外側
(B) 足部背屈 (dorsiflexion) 肌力下降
(C) 臀中肌髖外展 (hip abduction) 較無力
(D) 踝反射 (ankle reflex) 下降或消失

公告試題 僅供參考

21. 處理低血鈉症時，下列何種處置較不適當？
(A) 詢問是否使用利尿劑的藥物史
(B) 理學檢查檢視是否有下肢水腫
(C) 評估肝、腎功能
(D) 以 3% NaCl 快速矯正低血鈉以改善病人症狀

22. 以 isoniazid 治療肺結核時，同時使用 vitamin B_6 的目的是為了預防下列何種副作用？
(A) neuropathy (B) scurvy (C) rickets (D) bleeding

23. 關於抗結核藥物的描述，下列何者較正確？
(A) 孕婦宜使用 isoniazid
(B) 尿毒症病人使用 ethambutol 劑量與腎功能正常者相同
(C) 最容易與多種藥物發生 drug interaction 的是 rifampin
(D) 造成服藥後尿液變橘色的是 pyrazinamide

24. GINA guideline 對氣喘控制藥物分為暫時性緩解劑 (reliever) 和維持性控制劑 (controller)，下列何種藥物是最主要的維持性控制劑？
(A) inhaled corticosteroid (B) systemic corticosteroid
(C) short–acting β_2 agonist (D) short-acting anticholinergic

25. 使用鼻套管 nasal cannula 4L/min 對病人進行氧氣治療，請問提供 FiO_2 最接近的濃度為？
(A) 24% (B) 32% (C) 36% (D) 40%

26. 一位 30 歲女性突然於右上方的視野看到閃光，逐漸的呈鋸齒狀，之後越來越大，約 15 分鐘後閃光停止，但是同時逐漸產生頭痛，持續好幾個小時，而且伴隨著噁心感。這是她最近半年來第二次發作。下列何者為最可能的診斷？
(A) 癲癇 (B) 黑矇症 (C) 預兆性偏頭痛 (D) 青光眼

27. 38 歲張先生，過去健康良好，偶爾因血壓升高而服藥控制。一個月前熬夜工作後發生間斷性胸痛、咳嗽、發燒症狀。二週前吃成藥後，咳嗽、發燒症狀改善，但卻逐漸出現走路時心悸、氣促現象，休息後可消失。三天前開始特別疲倦，回家時爬到二樓就氣喘無力，無法再向上爬。依其症狀最可能是：
(A) 亞急性支氣管氣喘 (B) 心衰竭
(C) 不穩定型心絞痛 (D) 非典型肺炎

28. 下列何種藥物不適用在 gastroparesis？
(A) loperamide (Imodium®) (B) metoclopramide (Primperan®)
(C) domperidone (Motilium®) (D) erythromycin

29. 林小姐 43 歲，突然右上腹部疼痛且已持續 12 小時，疼痛會輻射到肩膀，並有發燒及寒顫的情形，她主訴過去曾經有相似但較輕微的狀況發生，身體檢查發現有明顯右上腹部壓痛情形，下列何者為最可能的診斷為？
(A) 肝癌 (B) 急性膽囊炎 (C) 腹膜炎 (D) 腸躁症

30. 急性腎損傷病人較少出現下列何症狀？
(A) uremia (B) hyperkalemia (C) hyponatremia (D) alkalosis

31. 下列何種抗生素最容易發生抽搐 (seizure) 的副作用？
(A) carbapenem (B) quinolone (C) aminoglycosides (D) cephalosporin

32. 有關愛滋病毒敘述，下列何者錯誤？
(A) 測到抗體如 ELISA 陽性即可確定診斷
(B) 當 CD4 淋巴球下降至 200/mL 以下時很容易有伺機性感染
(C) 愛滋病毒是屬於反轉錄 RNA 病毒
(D) 合併使用抗病毒藥(雞尾酒療法)已使愛滋病存活率大為提升

33. 下列何者屬於功能不良性子宮出血 (DUB) 的原因？
(A) atrophic endometrium
(B) anovulation
(C) abortion
(D) intrauterine device

34. 年輕女性主訴外陰與陰道搔癢、灼熱、陰道分泌物有如乳酪般，臨床上最可能的診斷是下列何者？
(A) atrophic vaginitis
(B) bacterial vaginosis
(C) trichomonas vaginitis
(D) vulvovaginal candidiasis

35. 附圖之卵巢陰道超音波影像，最可能之診斷為？
(A) 多囊性卵巢症候群(polycystic ovarian syndrome)
(B) 巧克力囊腫(endometrioma)
(C) 卵巢畸胎瘤(mature cystic teratoma)
(D) 卵巢膿瘍(ovarian abscess)



36. 趙太太因卵巢實心性腫瘤而住院，檢查後發現腹水及肋膜積水。術後病理檢查是卵巢良性腫瘤，臨床診斷為 Meigs syndrome；請問此卵巢腫瘤應為下列何者？
(A) granulosa cell tumor
(B) thecoma
(C) teratoma
(D) fibroma

37. 附圖之卵巢陰道超音波影像，最可能之診斷為？
(A) 多囊性卵巢症候群(polycystic ovarian syndrome)
(B) 巧克力囊腫(endometrioma)
(C) 卵巢畸胎瘤(mature cystic teratoma)
(D) 卵巢膿瘍(ovarian abscess)

38. 黃女士，28 歲，懷孕 31 週，清晨起床發現床褥上有一大灘鮮血，且無其它下腹疼痛症狀，您認為最可能是哪種診斷？
(A) 先兆性流產　(B) 胎盤早期剝離　(C) 前置胎盤　(D) 子癇前症

39. 張女士，懷孕 35 週，因破水且合併子宮收縮前來求診，下列處置何者最適當？
(A) 協助安排生產
(B) 使用宮縮緩解劑延長妊娠
(C) 使用類固醇促進胎兒肺部成熟
(D) 立即進行羊水灌注

40. 王女士，懷孕 30 週，因子宮頸開 3 公分，規則收縮，且有少量陰道出血而住院，下列何者不是必要使用的藥物？
(A) 類固醇促進胎兒肺部成熟 (B) 宮縮緩解劑延長妊娠
(C) 硫酸鎂保護胎兒神經系統 (D) 黃體素以減少出血量

41. 有關糖尿病孕婦的日常照護，下列何者較不適當？
(A) 添加纖維素有助於控制血糖
(B) 做飲食控制及運動
(C) 維持血糖值不低於 40 mg/dL
(D) 必要時配合注射胰島素或口服降血糖藥物

42. 在懷孕早期抽血做母血唐氏症篩檢時，發現血中胎兒甲型蛋白 (α-fetoprotein) 明顯升高，可能和下列何者有關？
(A) 胎兒神經管缺陷 (B) 妊娠糖尿病
(C) 唐氏症 (D) 透納氏症

43. 下列何者不是唐氏症胎兒的超音波檢查特徵？
(A) nasal bone hypoplasia
(B) nuchal fold thinning
(C) echogenic bowel
(D) mild renal pelvis dilation

44. 下列何項因素最明顯會增加子宮肌瘤發生的風險？
(A) Obesity (B) Pregnancy
(C) Combination oral contraceptives (D) Cigarette smoking

45. 待產過程中，發現胎兒監視器有持續之遲發性心搏減速 (late deceleration)，下列何項是可能的原因？
(A) 子宮胎盤間之血液灌流不足 (B) 臍帶受到壓迫
(C) 胎頭受擠壓 (D) 胎動

46. 在待產過程中，胎兒監視器發現有不明之胎兒心跳模式，懷疑有胎兒窘迫 (fetal distress) 時，下列處置何者不適當？
(A) 立即內診 (B) 停用催生藥物 (C) 請孕婦平躺 (D) 測量血壓

47. 王女士，28 歲，已婚，尚未懷孕，因罹患乳癌，術後將進行化學治療。她為了避免因化學治療後破壞卵巢功能而影響日後懷孕，因此在接受化學治療前，下列何項處置最合適？
(A) 冷凍部份卵巢組織 (B) 冷凍卵子
(C) 冷凍胚胎 (D) 全卵巢冷凍保存

48. 有關子宮肌瘤的敘述，下列何者較不正確？
(A) 大部分都沒有症狀
(B) 生長快速不意味是惡性腫瘤
(C) 大部分因懷孕而體積增加
(D) 超音波是最適合與經濟的影像學檢查

公告試題 僅供參考

49. 張女士，40 歲，診斷為不孕症，接受試管嬰兒治療，在取卵後一週突然自覺腹脹、下腹悶痛及尿量變少，前來急診就診，超音波檢查發現有嚴重腹水及雙側卵巢腫大，下列診斷及處置，何者不適當？
(A) 最可能之診斷為"卵巢過度刺激"
(B) 應立即給予利尿劑以增加尿液排出
(C) 若因腹水造成呼吸窘迫，可以進行腹水抽吸
(D) 給予適量輸液，可以改善低血壓及電解質不平衡之問題

50. 請問下列何項的監測，較不適合作為有無排卵的參考？
(A) 每日測量基礎體溫　　(B) 陰道超音波檢查濾泡發育
(C) 尿液 HCG (人類絨毛膜激素) 檢測　　(D) 尿液 LH (黃體刺激素) 檢測

51. 一對不孕症夫妻經檢查後，發現男性精蟲數目不足 (精液檢查報告：1.5 mL，$0.5x10^6$ 隻/mL)，下列何種人工生殖技術最適合這對夫妻？
(A) 服用排卵藥，並計算排卵時間同房
(B) 接受睪丸切片取精，並進行試管嬰兒治療 (in-vitro fertilization)
(C) 冷凍多次精液，解凍，進行人工授精 (intrauterine insemination)
(D) 以“單精蟲卵質注射術” (intracytoplasmic sperm injection) 進行試管嬰兒治療

52. 在施行子宮鏡時，請問下列何種方式最能減少子宮擴張液 (distension media) 進入全身血液循環所引起之合併症？
(A) 維持子宮腔壓力高於平均動脈壓
(B) 維持液體輸入與輸出子宮腔的總量平衡
(C) 使用幫浦加壓幫助液體撐起子宮腔
(D) 利用抽吸管收集輸出的液體

53. 下列何項藥物較不適宜於治療子宮內膜異位症相關之疼痛？
(A) nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID)
(B) dexamethasone
(C) combination oral contraceptives
(D) gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist

54. 張女士，30 歲，未曾懷孕，主訴在兩次月經間有出血，而且月經量增多，在過去 10 個月間，她接受了三次子宮內膜刮搔術，但症狀並未緩解，口服避孕藥和藥物治療也沒有減少異常出血。請問下列何種處置最恰當？
(A) hysterectomy
(B) laparoscopy
(C) endometrial ablation
(D) GnRH agonist

55. 王小姐今年 27 歲，產科史為 G2P2，想要有第三個寶寶，但已經三年都沒有再懷孕了。她的月經規則，但有嚴重經痛及白帶，曾在兩年前因為闌尾炎接受手術治療。她的先生 30 歲，她和先生都沒有內科方面的疾病。請問這對夫妻最有可能不孕的原因是？
(A) ovulatory dysfunction
(B) tubal factors
(C) male factors
(D) uterine abnormalities

56. 8 歲的李小妹，主訴下腹痛被帶到門診，超音波檢查發現右側卵巢有一顆 8 公分的腫瘤，請問下列的診斷何者最有可能？
(A) benign epithelial neoplasm
(B) malignant epithelial neoplasm
(C) follicular cyst
(D) germ cell tumor

57. 68 歲的許女士腹脹有三個月之久，經婦產科醫師觸診發現腹腔有腹水現象，超音波及內診則在右側卵巢有一顆約 8 公分不易移動及表面有結節的腫瘤，而左側卵巢萎縮不易觸摸到，檢查腫瘤指數 CA-125 為 850 U/mL，請問許女士最有可能是下列哪一個診斷？
(A) gonadoblastoma
(B) Meigs syndrome
(C) Krukenberg tumor
(D) epithelial cystadenocarcinoma

58. 48 歲的林女士，因子宮肌瘤和第 II 期卵巢癌，進行子宮及雙側輸卵管、卵巢切除後，第 5 天發現左側小腿腫脹，經診斷為 deep-venous thrombosis。下列何項處置最適當？
(A) 靜脈給予 streptokinase 72 小時，再給予 coumadin 3-6 個月
(B) 靜脈給予 streptokinase 24 小時，再給予 coumadin 3-6 個月
(C) 靜脈給予 heparin 5 天後，再給予 coumadin 3-6 個月
(D) 臥床抬高左腿後，立即給予 coumadin 3-6 個月

59. 一位 36 歲健康女性，G1P1，自 13 歲初經以來一直有規則的月經週期，主訴一年半前開始沒有月經。抽血結果顯示：β-hCG＜1.0 mIU/mL；estradiol＜20 pg/mL，FSH＞100 mIU/mL，prolactin＜20 ng/mL。另外，她有熱潮紅(hot flash)及性交疼痛(dyspareunia)的問題已影響她的生活。請問下列敘述何者不正確？
(A) 此個案是一個染色體異常的案例
(B) 此個案與同年齡有月經的女性相比，有較高的骨折和骨質流失的風險
(C) 早發性卵巢衰竭造成她的不適症狀
(D) 陰道雌激素製劑(vaginal estrogens)有助於改善性交疼痛的問題

60. 下列何者不是荷爾蒙補充治療的禁忌症？
(A)不明原因的陰道出血
(B)子宮內膜癌
(C)糖尿病
(D)偏頭痛和高血壓

61. 有關於早期破水之處置，下列何項處置較不適當？
(A)需觀察羊水的性質、顏色
(B)促進孕婦會陰的清潔以免感染
(C)因胎頭固定，須限制孕婦下床
(D)應監測胎心音變化

62. 懷孕中期後所發生之妊娠性糖尿病對胎兒的影響，下列敘述何者不正確？
(A) 胎兒過大
(B) 胎兒出生後黃疸
(C) 胎兒出生後低血糖
(D) 胎兒血液黏稠度變稀

63. 陳女士懷孕八週，但自超音波上無法發現妊娠囊，主訴有劇烈腹痛，進一步檢驗證實為子宮外孕，並有輸卵管破裂現象，需緊急施予手術，在手術之前專科護理師最應注意她下列哪些徵象？
(A) 宮縮和腹痛
(B) 血壓和脈搏
(C) 尿量和輸液
(D) 陰道出血情形

公職試題 僅供參考

64. 依據國民健康局公布的台灣女性十大癌症的發生率趨勢，下列何項女性癌症的發生率上升幅度最大？
(A) endometrial cancer (B) breast cancer
(C) cervical cancer (D) ovarian cancer

65. 第 I 和 II 期子宮內膜癌病人，手術後評估其復發風險以決定是否進行輔助性治療，下列何者不屬於關鍵的預後因子？
(A) 腫瘤侵襲子宮肌肉層深度 (B) 癌細胞是否有荷爾蒙接受體
(C) 癌細胞分化程度是否有改變 (D) 淋巴血管腔是否有癌細胞侵襲

66. 張女士，經切片診斷為子宮頸癌，術前評估發現腫瘤直徑為 3 公分、陰道壁上端 1/3 受到腫瘤侵襲、骨盆腔內診顯示兩側之子宮旁組織柔軟應無腫瘤侵襲現象，初步判斷，可能是第幾期之子宮頸癌？
(A) IB1 (B) IB2 (C) IIA1 (D) IIA2

67. 有關停經後婦女骨質疏鬆的敘述，下列何者不正確？
(A) 適度的鈣及維生素 D 補充有助於預防骨質疏鬆
(B) 戒菸和戒酒可降低骨折的機率
(C) Bone mineral density (BMD) 之 T-score 介於-1～-2.5
(D) Raloxifene證實可治療骨質疏鬆

68. 一位 32 歲女性曾經歷兩次懷孕，懷孕期間皆不自覺的子宮內口擴張，但無子宮收縮的現象，最後引起胎膜破裂導致自然分娩。目前第三次懷孕 14 週，下列何項處置最適當？
(A) 補充雌激素 (B) 補充黃體素
(C) 使用預防性安胎藥 (D) 安排子宮頸環紮手術

69. 有關子宮陰道脫垂 (uterovaginal prolapsed) 的臨床症狀與衛教，下列敘述何者較不適當？
(A) 性交疼痛、頻尿
(B) 建議練習凱格爾氏運動
(C) 躺著的時候會感覺有東西掉下來
(D) 衛教戒菸和減少咳嗽

70. 有關婦科腹腔鏡微創手術與傳統剖腹手術之比較，下列敘述何者較不適當？
(A) 前者手術傷口較小
(B) 前者手術後恢復較快
(C) 心肺功能不佳者不適合腹腔鏡微創手術
(D) 前者適合使用於腹腔嚴重沾粘的患者

71. 有關子宮頸癌疫苗接種之敘述，下列何者不正確？
(A) 預防子宮頸癌效果達 95%以上 (B) 接種對象以尚無性經驗者最佳
(C) 最佳接種的年齡約在青少年時期 (D) 注射後，仍須定期接受子宮頸抹片檢查

72. 有關子宮頸癌的敘述，下列何者不正確？
(A) 子宮頸癌與 HPV 病毒有關
(B) 性交後出血或不規則出血乃是症狀之一
(C) 大部份的子宮頸癌婦女是腺癌 adenocarcinoma
(D) 吸菸(包含二手菸)者也是高危險群之一

公告試題 僅供參考

73. 有關下列胎兒監視器的判讀，下列何者需要最優先評估處理？
(A) 心跳 100bpm，有很好的變異性(variability)
(B) 反覆且頻繁出現的胎兒心跳加速(acceleration)
(C) 心跳 160bpm，但變異性(variability)明顯
(D) 出現正弦波型之胎兒心跳模式(sinusoidal pattern)

74. 有關葡萄胎的敘述，下列何者正確？
(A) 術後需追蹤血液人類胎盤絨毛激素(HCG)濃度
(B) 不容易轉移到其他器官
(C) 發生率與母親年齡無關
(D) 常發生於蛋白質攝取過多的婦女

75. 有關妊娠糖尿病(GDM)之敘述，下列何者正確？
(A) 容易形成羊水不足
(B) 口服 50 公克葡萄糖水，一小時後血糖值低於 140 mg/dL
(C) 新生兒易有紅血球過高症
(D) 口服 100 公克葡萄糖水後三小時耐量試驗結果，單項數值偏高

76. 有關子宮外孕之治療藥物 Methotrexate(MTX)之適用條件，下列何者不正確？
(A) 輸卵管破裂併出血　(B) 血液中 β-hCG 少於 10,000 mIU/mL
(C) 外孕腫塊最大直徑少於 3.5 公分　(D) 胚胎尚未有心跳

77. 進行子宮鏡手術時，發生低張性子宮擴張液過度吸收的臨床表現，除了茶色尿或血尿外，可能的併發症不包括下列何者？
(A) 呼吸不順併泡沫狀痰液　(B) 意識改變或譫妄
(C) 少尿　(D) 持續大量子宮出血

78. 協助接生一位早產嬰兒，經過初步處理，五分鐘時嬰兒呈現呼吸慢且不規則，心跳每分鐘 120 下，四肢呈現屈曲狀微動，抽吸管刺激會咳嗽，身體呈現粉紅色但四肢末梢藍紫色，請問該嬰兒五分鐘的 Apgar score 應為幾分？
(A) 6　(B) 7　(C) 8　(D)9

79. 章女士於 2 週前接受陰道全子宮切除、膀胱修補及尿失禁手術(Burch)，回到門診時主訴有持續漏尿現象，她並沒有尿急或解尿疼痛。請問她最可能發生下列哪一種情形？
(A)泌尿道感染　(B)膀胱陰道瘻管
(C)膀胱過動症　(D)神經性膀胱

80. 妊娠高血壓患者常使用硫酸鎂($MgSO_4$)控制痙攣的發生，專科護理師應監測其血中鎂離子的濃度範圍(meq/L)為何？
(A) 1.5～2.5　(B) 4～7　(C) 10～12　(D) 15～17

【以下空白】