衛生福利部

104 年內(外)科專科護理師甄審筆試

准考證號碼：□□□□□□□□

(請考生自行填寫)

進階專科護理
外科(婦產科組)

公告試題
僅供參考

【注　意　事　項】

1.請核對考試科目與報考類(組)別是否相符。

2.請檢查答案卡、座位及准考證三者之號碼是否完全相同，如有不符，請監試人員查明處理。

3.本試卷共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分，答錯不倒扣。

4.本試卷均為單一選擇題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選一個最適當答案，在答案卡同一題號對應方格內，用 2B 鉛筆塗滿方格，但不超出格外。

5.本試卷空白處或背面，可做草稿使用。

6.請在試卷首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試卷」一併繳回。

7.有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。

1. 一位 82 歲女性，半年前被診斷為右側肺部的鱗狀上皮細胞癌，且合併肝臟轉移，在接受過 2 次化療後，因為感到極度不適而停止化療。近日因為噁心、嘔吐、腹痛、便秘、關節痛且極度虛弱而到急診求醫，造成其不適最可能的原因為何？
(A) 低血鎂 (B) 高血鈣 (C) 高血鉀 (D) 低血鈉

2. 一位慢性腎病病患，因腹部絞痛、肌肉痙攣入院，抽血檢查結果 Ca^{+2} 7.0 mg/dL，當進行身體檢查時，可能會有哪些發現？
① Chvostek's sign (+) ② Cullen sign (+) ③ Trousseau's sign (+) ④ Murphy's sign (+)
(A) ①② (B) ①③ (C) ②④ (D) ③④

3. 下列何者與高血鉀症較無相關性？
(A) Rhabdomyolysis
(B) Angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI)
(C) Loop diuretics
(D) NSAIDs

4. 一位 82 歲男性，因意識不清入急診，有高血壓病史，使用 Losartan 1# qd。生命徵象為 36.8℃、96 次/分、158/90 mmHg，Brain CT 沒有特殊發現，抽血檢查結果：glucose 70 mg/dL，K^+ 7.0 mEq/L，BUN 44.1 mg/dL，Cr 2.97 mg/dL，EKG 顯示 Peaked T wave，以下何項處理較為適當？
(A) 給予 50% glucose (20 ml/amp) + RI 10U (B) 予以口服 Kalimate 或 Kayexalate
(C) 給生理食鹽水 1000 ml 靜脈注射 (D) 在點滴中加入 KCl 20 mEq

5. 六歲的江小弟，因為嘔吐及意識狀態改變被送入急診，其動脈血液氣體分析為 pH 7.2，PaO_2 100 mmHg，$PaCO_2$ 25 mmHg，HCO_3^- 10 mEq/L；血液電解質檢查為 Na^+ 126 mEq/L， K^+ 5 mEq/L， Cl^- 95 mEq/L，病人有下列何種狀況？
(A) 代謝性酸中毒合併呼吸性代償，anion gap 增加
(B) 代謝性鹼中毒合併呼吸性代償，anion gap 正常
(C) 呼吸性酸中毒合併代謝性代償，anion gap 增加
(D) 呼吸性鹼中毒合併代謝性代償，anion gap 正常

6. 一位罹患糖尿病多年患者，血糖控制不理想，右腳跟有約 5×5cm 的傷口，深可見骨，分泌物極多，且有惡臭，其傷口採取濕敷 (wet dressing) 的最主要目的為何？
(A) 促進上皮化的過程，以縮短癒合的時間
(B) 減低局部的菌叢數目以減少抗生素的使用
(C) 清除傷口的滲出液、焦痂
(D) 降低水分由微血管滲入組織的速度

7. 有關 Fentanyl TTS 貼片之使用，下列說明何者正確？
(A) 貼上去立即有效，所以貼上後不需加上口服嗎啡來止痛
(B) 欲使用貼片處的皮膚應先將毛髮除去，以確保貼片與皮膚密合
(C) 副作用和嗎啡類似，但有較多的便秘、噁心、嘔吐
(D) 發燒或冒汗之病人，因為吸收速度不穩定，故不適於使用

8. 晚期癌症病人併有慢性疼痛症狀，使用下列何種鴉片類 (opioid 或 narcotic) 止痛藥物，最不恰當？
(A) Codeine (B) Tramadol (C) Meperidine (D) Hydromorphone

公告試題
僅供參考

9. 依據世界衛生組織的止痛藥物三階原則，若已經使用嗎啡 (morphine) 時，通常不會併用以下何種藥物輔助止痛？
(A) Acetaminophen
(B) Tramadol
(C) NSAID
(D) Gabapentin 或 Pregabalin

10. 以下何種藥物不屬於鴉片類止痛藥？
(A) Fentanyl
(B) Meperidine
(C) Codeine
(D) Acetaminophen

11. 下列何者較不可能是急性胰臟炎的病因？
(A) 喝酒
(B) 高膽固醇
(C) 膽結石
(D) 施作逆行性膽管攝影

12. 政府以預算或健保給付進行之肝癌預防策略，不包括何者？
(A) 高風險地區 (如山地鄉) 幼童 A 型肝炎疫苗接種
(B) 全國新生兒 B 型肝炎疫苗接種
(C) 慢性 B 型或 C 型肝炎病人定期就醫追蹤 (超音波檢查及血液檢驗)
(D) 慢性 B 型或 C 型肝炎病人符合特定條件時給付藥物 (口服抗病毒藥物、注射干擾素)

13. 有關結核病防治的敘述，下列何者正確？
(A) 痰液塗片耐酸性染色 AFB (acid - fast bacilli) 鏡檢為陽性的病人，皆須立即投予抗結核藥物
(B) 肺結核的初次感染病灶 (primary focus) 通常發生在左右兩側肺尖處
(C) 一般而言，肺結核與肺外結核治療藥物的選擇是一樣的
(D) 結核菌感染後發病率超過 50%

14. 有關多重抗藥性結核病的敘述，下列何者錯誤？
(A) 菌株經分子檢驗確認為 Rifampicin 及 Isoniazid 抗藥者
(B) 傳染病防治法 (2009) 已將其納入第三類法定傳染病
(C) 多重抗藥性結核病陰轉定義為：連續 2 次間隔 30 天的塗片 (培養) 為陰性
(D) 多重抗藥性結核病之治療至少需持續 18-24 個月，並執行進階都治 (DOTS – plus) 治療

15. 有關醫療照護相關感染監測及防治重點微生物之一「Vancomycin - resistant Enterococci」，以下描述何者正確？
(A) 為革蘭氏陰性球菌
(B) 無法存活於惡劣環境
(C) 常見菌株 *E. faecalis* 非正常腸道菌叢的一部份
(D) 病菌污染醫療工作人員的手可持續至 60 分鐘

16. 有關登革熱的敘述，下列何者錯誤？
(A) 登革熱主要的傳染媒介為白線斑蚊與埃及斑蚊
(B) 登革熱休克症候群原因為病人出現血漿滲漏導致血壓下降
(C) 即使早期給予適當的靜脈輸液及支持性治療，登革熱休克症候群之死亡率仍超過 30%
(D) 登革熱病毒分為 4 種血清型，感染第一型後再感染第二型病症最為嚴重

17. 有關諾羅病毒 (Norovirus) 感染，下列何者錯誤？
(A) 易造成呼吸照護中心和身心障礙機構等發生腸胃炎群聚
(B) 人類易感受性低、感染約需 1000 病毒量 (viral particles) 才會致病
(C) 傳染途徑，主要以糞口途徑為主
(D) 潛伏期通常是 24 至 48 小時

公告試題
僅供參考

18. 下列何種病原體酒精消毒效果最差？
(A) 綠膿桿菌(*Pseudomonas aeruginosa*)　(B) 流行性感冒病毒(Influenza virus)
(C) 白色念珠菌(*C. albicans*)　(D) 難醫梭狀桿菌(*Clostridium difficile*)

19. 根據我國傳染病防治法規定，第三類法定傳染病必須在多久內通報當地主管機關？
(A) 二十四小時內　(B) 七十二小時內　(C) 一週內　(D) 一個月內

20. 罹患低血鉀之高血壓病人，其降血壓藥物選擇應避免下列何者？
(A) Thiazide 利尿劑　(B) 乙型交感神經阻斷劑
(C) 鈣離子阻斷劑　(D) 血管升壓素轉換酶抑制劑

21. 一位 62 歲女性，在門診量得血壓 174/104 mmHg，心跳 82 次/分，血鈉 137 mEq/L，血鉀 2.9 mEq/L。尿液檢測無尿蛋白。其後續影像檢查以何者為優先？
(A) 下肢血管超音波檢查　(B) 腦血管超音波檢查
(C) 心臟超音波檢查　(D) 腹部超音波檢查

22. 有氣喘病史之心絞痛患者，其藥物治療應避免下列何者？
(A) 乙型交感神經阻斷劑
(B) 血管升壓素轉換酶抑制劑
(C) 硝酸鹽類血管擴張劑
(D) 鈣離子阻斷劑

23. 變異型心絞痛患者接受藥物治療期間偶有夜間胸悶。數月後門診追蹤運動心電圖檢查，總運動時間 8 分 10 秒、無胸悶，但心電圖出現輕度心肌缺氧變化。後續應如何處置？
(A) 因一般預後良好，持續觀察追蹤即可
(B) 立即加重 nitrate 及乙型交感神經阻斷劑之劑量
(C) 立即加重 aspirin 之劑量
(D) 立即安排心導管檢查，以確認冠狀動脈是否狹窄及其程度

24. 氣喘的治療藥物分控制型藥物(controller)及緩解型藥物(reliever)，下列何者是最適當的控制型藥物？
(A) Inhaled corticosteroid　(B) Theophylline
(C) β_2-Agonists　(D) Anti-cholinergics

25. 下列何者不是出血性腦中風常見的危險因子？
(A) 高血壓(hypertension)　(B) 高血脂(hyperlipidemia)
(C) 藥物濫用(drug abuse)　(D) 凝血病變(coagulopathy)

26. 一位 20 歲男性，因突發性頭痛至急診求診，到院後出現嗜睡、體溫升高(攝氏 38 度)，有頸部僵硬現象；影像學檢查未發現局部病灶。腦脊髓液檢查初始壓力 opening pressure 230 mmH_2O、WBC 4000/μL、glucose 25 mg/dL、RBC 2/μL、protein 80 mg/dL；下列敘述何者正確？
① 分辨是 neutrophils 或 lymphocyte predominance 以鑑別 Rickettsial disease
② 詢問野外旅遊史以鑑別 bacterial or viral meningitis
③ 作 Gram's stain，以進一步考慮是否為 bacterial meningitis
④ 應考慮抗生素治療
(A) ①②　(B) ②③　(C) ③④　(D) ①④

公告試題
僅供參考

27. 在加護病房中一位 60 歲女性，突然喪失意識，量不到血壓，心電圖如下(圖一)，以下治療步驟何者錯誤？

(圖一)

(A) 傳統電擊器(monophasic)給予 100 焦耳的電擊
(B) 給予體外心臟按摩，進行 CPR 程序
(C) 抗心律不整藥物可以優先考慮 amiodarone
(D) 可放置 waveform capnography($ETCO_2$)來增加 CPR 的品質

28. 關於糖尿病患低血糖的處理，下列何者錯誤？
(A) 懷疑低血糖時，應立即檢測血糖，以確定診斷
(B) 意識清楚的病人，給予口服醣類 15 - 20 g，例如：方糖、含糖飲料
(C) 意識不清的病人，靜脈注射 20 - 50 ml 50%的葡萄糖或肌肉注射升糖素 0.5 - 1.0 mg
(D) 對低血糖不自覺的病人，因為沒有低血糖的症狀，血糖控制標準可以更嚴格

29. 一位 20 歲女性，因心悸、失眠、體重減輕來診，理學檢查發現 grade 2 goiter，皮膚濕熱、眼球稍突出，有怕光現象容易流淚，抽血檢查：free T_4 3.0 ng/dL、TSH < 0.001 μU/mL，下列敘述何者錯誤？
(A) Levothyroxine sodium (T_4)為治療首選
(B) 此病是因 TSH 受體抗體引起的
(C) 若給予放射碘治療，會增加甲狀腺危象的風險
(D) 預計 6～8 週抗甲狀腺藥物治療可使甲狀腺機能正常

30. 有關細菌性肝膿瘍的敘述，下列何者錯誤？
(A) 可能由血行性傳染、膽道上行感染
(B) 血液培養菌種在台灣最常見為大腸桿菌
(C) 白血球通常會增加
(D) 通常須用抗生素治療

31. 一位 54 歲女性，無心血管病史，半年前開始偶而於夜間睡眠時因胸悶而驚醒，最近一週又復發一次，應優先安排何種檢查？
(A) 胸部放射線 X 光檢查
(B) 運動心電圖
(C) 24 小時心電圖監測
(D) 心臟超音波檢查

32. 關於 ICU 病人譫妄(delirium)之敘述，下列何者錯誤？
(A) 譫妄與 ICU 病人死亡率有關
(B) Alcoholism 是產生譫妄的危險因子
(C) Benzodiazepine 鎮靜藥物的使用會增加譫妄發生的風險
(D) 使用呼吸器的病患，給予 dexmedetomidine 藥物鎮靜會增加譫妄的風險

公告試題
僅供參考

33. 下列有關泌尿道感染的說明，下列何者最適當？
(A) 膀胱炎 (cystitis) 在女性的發生率高於男性 2 倍
(B) 中段尿液檢驗出現白血球與蛋白質生成物，即可診斷為膀胱炎
(C) 青少女患泌尿道感染的機率較更年期婦女高
(D) 使用子宮隔膜 (Diaphragm) 可以有效預防泌尿道感染的機會

34. 曾女士 35 歲，妊娠 35 週，突然發生劇烈腹痛，並有持續性宮縮，每 2 分鐘一次且合併少量出血，至急診檢查發現胎兒心跳有遲發性心搏過緩現象，下列敘述何者最恰當？
(A) 妊娠高血壓是危險因子之一
(B) 超音波都可以正確診斷
(C) 為剖腹產之禁忌症，應選擇自然產
(D) 建議安胎至 37 週

35. 自然產婦出院當天含淚告訴你，她害怕出院後無法順利照顧新生兒。產婦本身無任何精神病史，下列何者是最佳的處理方式？
(A) 照會精神科
(B) 跟病人解釋她的情緒應該會在接下來的 2~3 天逐漸改善
(C) 給予選擇性血清素再吸收抑制劑 (Selective Serotonin Reuptake Inhibitor)
(D) 建議延長住院以觀察重度憂鬱症狀 (major depression)

36. 下列何者不是胎兒生理評估 (Fetal Biophysical Profile, BPP) 的要件？
(A) 胎動 (fetal movement)
(B) 胎兒呼吸運動 (fetal breathing)
(C) 羊水量 (amnionic fluid volume)
(D) 催產素挑戰試驗 (Oxytocin challenge test)

37. 右側卵巢靜脈回流到哪一條血管？
(A) 下腔靜脈
(B) 右側腎靜脈
(C) 右側內髂骨靜脈
(D) 胸廓靜脈

38. 懷孕 32 週婦女因有早產跡象接受 indomethacin (indocin) 的治療，若仍然無法阻止早產的發生而產下早產兒，應注意觀察早產兒可能出現下列何種臨床徵兆？
(A) Pulmonary hypertension
(B) Respiratory distress syndrome (RDS)
(C) Hyperbilirubinemia
(D) Cardiomyopathy

39. 根據美國婦產科醫學會 2012 年制定的建議，下列何者不是『非侵入性胎兒染色體檢測』(non-invasive prenatal test) 的適應症？
(A) 母親生產時年紀超過 35 歲
(B) 曾產下神經管缺損異常者
(C) 第一孕期或第二孕期唐氏症篩檢發現異常者
(D) 曾產下唐氏症胎兒者

40. 下列關於 X 染色體脆折症 (Fragile X Syndrome) 的敘述何者錯誤？
(A) 發病原因為 FMR1 (Fragile-X mental retardation) 基因發生突變，位於 Xq27
(B) 造成突變的原因為基因出現三核甘酸 CGG 重覆 (trinucleotide repeat) 次數有異常擴增的現象
(C) CGG 重覆 (trinucleotide repeat) 次數達 45 次以上即會出現智能障礙等臨床症狀
(D) 美國婦產科醫學會建議卵巢早衰 (premature ovarian insufficiency) 者，產前需進行母血篩檢

41. 下列何者非產前唐氏症篩檢四指標的項目？
(A) 胎兒甲型蛋白 (AFP, Alpha-fetaprotein)
(B) 妊娠相關血漿蛋白-A (PAPPA, pregnancy-associated plasma protein A)
(C) 游離性乙型人類絨毛性腺激素 (free β-hCG)
(D) 抑制素 A (lnhibin A)

公告試題
僅供參考

42. 下列何者不是肩難產時該使用的方法？
(A) McRoberts maneuver
(B) Suprapubic pressure
(C) Woods screw maneuver
(D) Fundal pressure

43. 哺乳期間，若母親感染何種傳染性疾病，臨床上不建議繼續哺乳？
(A) 急性 B 型肝炎
(B) 猛爆性 C 型肝炎
(C) 未經治療且具活性的肺結核
(D) 化膿性乳腺炎

44. 陳女士 38 歲，妊娠 31 週有早產現象入院，使用乙型腎上腺素受體作用 (Ritodrine) 後，出現心悸與胸痛現象，以下處置何者不恰當？
(A) 進行聽診與胸部 X 光檢查
(B) 可能是使用 Ritodrine 之副作用
(C) 改用硫酸鎂安胎至足月
(D) 可改用 Atosiban

45. 劉女士，妊娠 16 週，因少量陰道出血伴隨腹部下墜感前來求診，經內診發現有 2 公分子宮頸擴張現象，超音波檢查發現羊膜成一氣球般突出於子宮頸中，您認為最優先之處置為何？
(A) 給予預防性安胎藥
(B) 安排子宮頸環紮手術
(C) 補充雌激素
(D) 補充黃體素

46. 妊娠糖尿病的血糖控制，可以減少新生兒低血糖及體重過重的發生，下列何者為較佳的指標？
(A) 糖化血色素 (HbA1C) 值
(B) 空腹之血糖值
(C) 飯後一小時之血糖值
(D) 三餐飯前之血糖值

47. 陳女士 35 歲，妊娠 35 週，因血壓 180/120mmHg 入院，尿中蛋白 3+，並有溶血、AST/ALT 升高和血小板少於 10^5/毫升，且合併有子宮收縮與陰道出血情況，請問對於此孕婦之臨床處置以下何者最不適當？
(A) 監測尿量與肝腎功能
(B) 給予硫酸鎂 ($MgSO_4$) 預防子癇症發生
(C) 給予降血壓藥物控制血壓
(D) 給予 Ritodrine 延長妊娠

48. 子癇前症 (Preeclampsia) 的降血壓藥物，下列何者不包括？
(A) Nifedipine
(B) Labetalol
(C) Hydralazine
(D) Capoten

49. 李女士 38 歲，之前規則產檢且無異常發現，目前懷孕 24 週，血壓為 150/100mmHg，尿中蛋白為 2+，並伴隨輕微頭痛及下肢水腫，使用硫酸鎂 ($MgSO_4$) 預防子癇症發生，請問下列敘述何者錯誤？
(A) 避免使用鈣離子拮抗劑降血壓
(B) 腎功能不佳時 4 公克硫酸鎂的初始劑量應減半
(C) 監測呼吸次數
(D) 如發生鎂離子過高時應停藥，並給予葡萄糖酸鈣 (Calcium gluconate)

50. 關於診斷性腹腔鏡，下列敘述何者不恰當？
(A) 常因組織或水分黏著而讓視野變小
(B) 確定子宮內膜異位症或沾黏的最佳工具
(C) 必須腹腔鏡確診，才以藥物治療子宮外孕
(D) 在清晰度及明亮度上腹腔鏡可以超越肉眼

51. 關於子宮內膜癌，以下敘述何者不恰當？
(A) 更年期的結合型荷爾蒙治療會增加子宮內膜癌的風險
(B) 在門診作子宮內膜取樣切片的準確性約有九成
(C) 疑似子宮內膜癌的患者，可以使用 D & C 來協助診斷
(D) 子宮內膜癌裡最常見的組織型態是 endometrioid adenocarcinoma

公告試題
僅供參考

52. 下列何者不是子宮內膜癌的流行病學危險因子？
(A) 吸菸
(B) 乳癌治療後，長期使用 Tamoxifen 預防復發
(C) 糖尿病
(D) Lynch II 家族

53. 下列何項在 2009 年 FIGO 子宮內膜癌分期，未將其列為影響的預後因子？
(A) 年齡
(B) 腹腔沖洗液的細胞學檢查
(C) 子宮肌肉層侵犯的深度
(D) 淋巴血管的侵犯 (LVSI)

54. 下列有關子宮肌瘤手術治療的敘述，何者較為恰當？
(A) 剖腹生產是切除肌瘤的好時機
(B) 腹腔鏡切除子宮肌瘤較花時間，但出血較少
(C) 子宮鏡電燒切除黏膜下肌瘤，擴張液選用生理食鹽水最佳
(D) 子宮肌瘤應該立即切除，以免復發及惡性變化

55. 王小姐 54 歲，未婚，無性經驗，例行健檢時，超音波檢查發現右側卵巢有一個約 6 公分的腫瘤，並有乳突狀中隔和腫瘤中的血流增加，CA125:34 U/ml。以下處置何者較適當？
(A) 在電腦斷層影像導引下進行腫瘤穿刺切片檢查
(B) 定期追蹤檢查，囊腫可能會消失
(C) 儘快安排手術，做病理評估
(D) 藉避孕藥的賀爾蒙療效，加速卵巢囊腫的消除

56. 有關婦女膀胱疼痛症候羣 (bladder pain syndromes) 的說明，下列何者錯誤？
(A) 也稱為間質性膀胱炎 (interstitial cystitis)
(B) 通常六週內自行緩解
(C) 病人會出現急尿的症狀
(D) 通常找不到明顯之組織學病灶

57. 尿失禁患者的鑑別評估，下列何者較不適當？
(A) 尿液檢查 (Urinalysis)
(B) 排尿日記 (voiding diary)
(C) 咳嗽壓力測試 (cough stress test)
(D) 棉墊測試 (Pad test)

58. 對於接受試管嬰兒療程 (體外受精) 的不孕婦女，在取卵手術前會施打「破卵針」來誘導卵子成熟，請問「破卵針」的成份為下列何者？
(A) Progesterone
(B) FSH (Follicle-stimulating hormone)
(C) AMH (Anti-müllerian hormone)
(D) hCG (Human chorionic gonadotropin)

59. 下列何者為快速靜脈注射催產素 (Oxytocin) 最常見的副作用？
(A) 心律不整
(B) 癲癇發作
(C) 低血壓
(D) 肌肉無力

60. 黃體功能不良 (luteal-phase defect) 可能導致不孕症，下列何方法不能當作診斷的參考？
(A) 排卵檢測試紙
(B) 記錄基礎體溫
(C) 黃體中期血中黃體素濃度
(D) 內膜切片

公告試題
僅供參考

61. 有關多囊性卵巢症候 (polycystic ovarian syndrome) 的診斷標準，不包括下列哪一項？
(A) 卵巢變小
(B) 卵巢呈現多囊狀
(C) 無排卵
(D) 血中男性荷爾蒙上升

62. 根據 2013 年美國婦產科醫學會(ACOG)的建議，將胎心音監測準則依嚴重程度分為三級，下列何者非第三級胎心音 (category III) 異常？
(A) Early variable deceleration and Absent baseline fetal heart rate variability
(B) Recurrent variable deceleration and Absent baseline fetal heart rate variability
(C) Recurrent late deceleration and Absent baseline fetal heart rate variability
(D) Sinusoidal Fetal Heart Rate

63. 關於卵巢癌， 以下敘述何者為不恰當？
(A) 口服避孕藥可以減少卵巢癌的風險
(B) 若基因檢測確認有 BRCA 基因突變，可在完成生育之後，將卵巢輸卵管予以預防性的切除
(C) 卵巢癌包含了上皮性與生殖細胞性等不同的組織類型
(D) 一旦發現血中 CA125 數值異常，極可能是卵巢癌的徵兆

64. 關於子宮內膜癌，以下何者為不恰當？
(A) 子宮內膜癌的治療以手術為主
(B) 視病理報告的狀況，手術之後可能還需要放射線治療或化學治療
(C) 手術治療不宜用腹腔鏡，因為腹腔鏡手術所使用的 CO_2 灌氣可能會造成腹腔內之癌細胞擴散
(D) 欲保留生育能力的年輕患者，若為分化良好的 endometrioid type 且 MRI 看起來沒有子宮肌肉層的侵犯，則可以考慮以高劑量的黃體素來治療

65. 若產前胎心音監測出現正弦曲線胎心率 (Sinusoidal Fetal Heart Rate)，表示胎兒窘迫，請問下列有關於正弦曲線胎心率的敘述何者為非？



(A) 存在胎心率加速期 (accelerations)
(B) 基礎胎心率在每分鐘 120~160 之間
(C) 上下震盪幅度為 5~15 bpm (次/每分鐘)
(D) 週期為一分鐘 2~5 次

公告試題
僅供參考

66. 關於更年期的荷爾蒙補充療法，以下何者為不恰當？
(A) 可減少停經婦女心血管疾病的風險
(B) 可減少髖骨骨折的風險
(C) 可減少大腸直腸癌的風險
(D) 若只使用雌激素而沒使用黃體素，則乳癌的風險並不會上升

67. 王女士 35 歲，因下腹悶痛至婦科門診檢查，超音波發現一個 6 公分單側卵巢附屬器官腫瘤 (如右圖)，依照圖示特徵最為可能之診斷為何？



(A) 黃體囊腫 (Corpus luteum cyst)
(B) 卵巢癌 (Ovarian cancer)
(C) 畸胎瘤 (Teratoma)
(D) 巧克力囊腫 (Chocolate cyst)

68. 黃女士 32 歲，因為青春痘及手腳多毛來求診，主訴月經不規則，每年只有 2～3 次。抽血檢查發現她的 FSH 於正常值邊緣，但 LH 值卻很高，最可能的診斷為何？
(A) Sheehan syndrome
(B) testicular feminization syndrome
(C) polycystic ovarian syndrome
(D) ovarian theca cell tumor

69. 劉女士 38 歲，因陰道不正常出血至婦科門診求診，內診檢查發現子宮頸腫瘤約 5 公分，腫瘤無侵犯陰道，子宮旁組織 (parametrium)，當下做了子宮頸腫瘤切片手術，後續病理報告為鱗狀上皮細胞癌(squamous cell carcinoma)，請問病人子宮頸癌 FIGO 分期為何？
(A) Stage IB1
(B) Stage IB2
(C) Stage IIA1
(D) Stage IIA2

70. 接續上題，病人住院後接受術前評估，包括大腸鏡、膀胱鏡、影像學檢查，於是決定接受以手術為主的治療方式，下列何者非必要手術？
(A) 子宮頸癌根除術 (Radical hysterectomy)
(B) 雙側卵巢輸卵管切除術 (Bilateral salpingo-oophorectomy)
(C) 雙側骨盆腔淋巴結摘取術 (Bilateral pelvic lymph node dissection)
(D) 腹腔內可疑病灶切片 (Peritoneal biopsy)

71. 蔡女士 37 歲，因不孕 6 年，接受腹腔鏡手術，診斷為中度子宮內膜異位症 (stage Ⅲ)，後續治療，何者為最佳處置？
(A) 使用避孕藥
(B) danazol
(C) GnRH agonist
(D) 積極懷孕

72. 通常治療子宮內膜異位症之藥物，是藉由抑制卵巢分泌雌激素，來打斷內分泌性腺軸 (Hypothalamic-pituitary-ovarian axis)，下列何項藥物非此作用機制？
(A) 避孕藥 (Oral contraceptive pills)
(B) 促性腺激素釋放賀爾蒙促效劑 (GnRH agonists)
(C) 非類固醇型抗炎藥 (NSAIDs)
(D) 芳香環轉化酶抑制劑 (Aromatase inhibitors)

公告試題
僅供參考

73. 鄭女士 33 歲，BMI＝38，經診斷為多囊性卵巢症候群 (polycystic ovarian syndrome) 來醫院求診，主訴想要懷孕。下列那種治療或建議最不推薦？
(A) 減重
(B) 使用 spironolactone
(C) 使用 clomiphene
(D) 安排陰道超音波及輸卵管攝影檢查，並請先生進行精液檢查 (semen analysis)

74. 李小姐第一次產檢抽血結果發現她的紅血球比較小，MCV 68 fL，MCH 21 pg，Hb 12.2 g/dL，產前諮詢時，下列敘述何者不適當？
(A) 李小姐有可能是地中海型貧血帶因 (carrier) 或者是缺鐵性貧血
(B) 如果先生的 MCV 也小於 80 fL，要請夫妻雙方一起作地中海型貧血的基因檢測
(C) 如果夫妻雙方一個是甲型帶因，一個是乙型帶因，可能會生下重症的小孩，須靠終生輸血
(D) 地中海型貧血分為 thalassemia major, thalassemia minor 以及 thalassemia intermedia

75. 郝女士 32 歲，因不孕症到門診求治，醫師開立 Clomiphene citrate 處方來誘發其排卵功能。開始使用此藥前，專科護理師應提供以下何項藥物指導？
(A) 會使得月經週期縮短為每週一次
(B) 可能會導致子宮內膜增厚情形
(C) 不會導致多胎懷孕
(D) 可能有噁心、體重增加、情緒不穩等情形

76. 毛女士 28 歲，至婦科門診求診，主述近兩週出現黏性濃稠陰道分泌物、頻尿及解尿灼熱感、下腹部悶痛的情形，他有固定男友，醫師診斷是披衣菌感染 (Chlamydial infection)，下列何者不恰當？
(A) 披衣菌感染在女性及男性均易導致不孕症
(B) 若懷孕者受披衣菌感染易導致早期破水、早產
(C) 第三妊娠期建議應做披衣菌篩檢
(D) 男女雙方均應接受藥物治療，治療期間避免性生活

77. 劉女士 28 歲，懷孕 26 週，因點狀出血至門診就醫，主訴四天前即有深紅黑色出血且併有下腹部絞痛的症狀，醫師予做腹部超音波診斷為胎死腹中(intrauterine fetal demise)，劉女士不想接受積極處置，希望胎兒能自然流出，這時專科護理師須密切注意下列何項危險徵兆？
(A) hCG 值上升　(B) 系統性過敏反應　(C) 骨髓抑制現象　(D) 凝血功能不全

78. 陳女士，初產婦懷孕 28 週，併發第 2 級心臟病，至門診就醫，專科護理師教導當出現下列何種狀況時，應立即返院就醫？
(A) 休息時感到呼吸短促
(B) 腳踝處出現嚴重水腫
(C) 工作上壓力過大時
(D) 體重增加超過 0.5 公斤/週

79. 下列有關卵巢癌的敘述，何者最恰當？
(A) 長期使用口服避孕藥的女性較易罹患卵巢癌
(B) 初經早停經晚的婦女，發生卵巢癌的機率較低
(C) 將兩側卵巢切除可減少卵巢癌的發生
(D) 卵巢癌好發於高生育婦女

80. Betamethasone 能誘發早產兒的肺部成熟度提高，以下何種情況可使用？
(A) 使用子宮鬆弛劑者
(B) 妊娠糖尿病者
(C) 庫欣氏症候群者
(D) 雙胞胎妊娠

公告試題
僅供參考

【以下空白】