入場證號碼：□□□□□□□□□□

（請考生自行填寫）

衛生福利部 108 年度內(外)科專科護理師甄審

【第二次筆試甄審】試題

報考科(組)別： 婦產科組

科　　目： 進階專科護理

試題公告
僅供參考

—作答注意事項—

① 應考人須按編訂座位入座，作答前應先檢查答案卡、桌角貼條及入場證三者之號碼，均須完全相同，如有不符，應立即舉手，請監試人員查明處理。使用非本人答案卡作答者，依簡章規定辦理。

② 請於試題本之入場證號碼欄內書寫入場證號碼。若試題本有缺漏、污損或科別、科目不符等問題，應立即舉手請監試人員查明處理。

③ 答案卡須保持清潔完整，請勿折疊、破壞或塗改入場證號碼及條碼，亦不得書寫應考人姓名、入場證號碼或或與答案無關之任何文字或符號。

④ 本試題本為雙面，共100分，答案卡每人一張。未依規定劃記答案卡，導致電腦判讀系統無法正確判讀計分者，其責任由應考人自負。

⑤ 答案卡採用黑色2B鉛筆劃記。請按試題之題號，依序在答案卡上同題號之劃記答案處作答；未劃記者，不予計分。答案更正時，請用橡皮擦將所劃之記號完全擦拭乾淨，再行劃記，請勿使用修正液(帶)；且勿在橡皮擦上沾口水擦拭，以免卡片破損。

⑥ 有關數值計算的題目，以最接近的答案為準。

⑦ 考試結束，答案卡務必繳回，未繳回者該科不予計分。

試題公告
僅供參考

選擇題【共 80 題，每題 1.25 分，共 100 分】

1. 一位52歲女性，因意識混亂而入院，評估深腱反射下降、噁心、食慾不振、肌肉無力，心電圖檢查發現ST段變短及QT間隔縮小，最可能是下列何種問題？
   (A) 低血鈉　(B) 高血鈣
   (C) 高血鎂　(D) 低血鉀

2. 下列何者不是導致低容積性低血鈉(hypovolemic hyponatremia)之可能原因？
   (A) 失血(blood loss)
   (B) 腹瀉(diarrhea)
   (C) 醛固酮缺乏(aldosterone deficiency)
   (D) 抗利尿激素不當分泌症候群(SIADH)

3. 動脈血液氣體分析結果：pH 7.32、P_aO_2 96 mmHg、P_aCO_2 30 mmHg、HCO_3^- 18 mEq/L、Na^+ 138 mEq/L、K^+ 3.5 mEq/L、Cl^- 97 mEq/L，此檢驗結果可以排除下列何項原因？
   (A) 循環休克　(B) 糖尿病酮酸中毒
   (C) 嘔吐或腸道引流　(D) 服用過量阿斯匹靈(aspirin)

4. 一位50歲男性，有慢性疼痛，疼痛指數由5分增加至8分，下列止痛劑何者最為適當？
   (A) tramadol　(B) codeine
   (C) meperidine　(D) oxycodone

5. 下列何者與高血鉀症較無相關？
   (A) rhabdomyolysis
   (B) angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI)
   (C) loop diuretics
   (D) NSAIDs

試題公告
僅供參考

6. 一位60歲男性，糖尿病多年，血糖控制不佳，因右內踝關節處傷口長期癒合差，這二天出現發燒，傷口紅潤，邊緣不規則，有些許腐肉，並有滲液，患者可能是何種問題？
   (A) 靜脈性潰瘍　(B) 動脈性潰瘍
   (C) 神經病變性潰瘍　(D) 糖尿病足性潰瘍

7. 一位4歲小男孩，被隔壁鄰居的貓咬傷小腿，傷口2x3公分，以下哪個處置最為恰當?
   (A) 應給予預防性抗生素 cephalosporins治療
   (B) 傷口需要縫合
   (C) 可不須施打破傷風疫苗加強劑
   (D) 儘量避免抬高傷口以降低細菌隨血流運行身體

8. 心搏出量（cardiac output）減少，中心靜脈壓（CVP）升高，比較可能是下列哪一種休克？
   (A) 出血性休克（hemorrhagic shock）
   (B) 心因性休克（cardiogenic shock）
   (C) 敗血性休克（septic shock）
   (D) 神經性休克（neurogenic shock）

9. 一位20歲男性，昨日開始出現發燒、頭痛、寒顫、全身倦怠、噁心及嘔吐，因症狀持續而就診，理學檢查發現患者皮膚有出血點、頸部僵硬、脊髓液培養為格蘭氏陰性雙球菌，其最有可能的致病菌為何？
(A) *Neisseria meningitidis*　(B) *Streptococcus pneumoniae*
(C) *Klebsiella pneumoniae*　(D) *Haemophilus influenzae*

10. 患者使用麻醉止痛劑一段時間後，當給予原先止痛藥的劑量，其止痛效果卻降低，而需較大劑量才可維持原先的止痛效果，此為何種現象？
(A) 生理性依賴 (physical dependence)　(B) 成癮 (addiction)
(C) 戒斷徵候 (withdrawal syndrome)　(D) 耐受性 (tolerance)

11. 一位15歲男性，假日出遊吃了生魚片，次日晚上開始發燒、腹瀉、噁心、嘔吐、且大便有血絲，依據上述症狀，最常見的致病菌為何？
(A) *Salmonella enteritidis*　(B) *Staphylococcus aureus*
(C) Rotavirus　(D) *Bacillus cereus*

12. 臨床上，常以發燒合併黃疸表現的感染症中，不包括哪一項？
(A) 病毒性肝炎（viral hepatitis）　(B) 痢疾（dysentery）
(C) 瘧疾（malaria）　(D) 膽管炎（cholangitis）

13. 有關低劑量胸部電腦斷層掃描(LDCT)肺癌篩檢的描述，何者最不可能？
(A) 可發現0.3公分以上的肺部結節，偵測力比胸部X光好
(B) 肺部腫瘤小於1公分即以手術切除，其治癒率為85%~95%
(C) 建議年齡介於55-74歲，且吸菸超過30包/年的高危險群接受此篩檢
(D) 若有肺癌家族史，健保可給付篩檢費用

14. 有關食道癌的生理機轉與診療的敘述，下列何者正確？
(A) 女性多於男性
(B) 體重過輕為常見的危險因子
(C) 食道下1/3部位的食道癌細胞型態為鱗狀細胞癌
(D) 食道下1/3部位的食道癌與胃食道逆流有關

15. 下列何種抗生素最容易發生抽搐 (seizure) 的副作用？
(A) carbapenem　(B) quinolone
(C) aminoglycosides　(D) cephalosporin

16. 有關癌症腫瘤指標監測，下列敘述何者較不可能？
(A) 卵巢癌監測 CA 125　(B) 大腸直腸癌監測 CEA
(C) 甲狀腺癌監測 immunoglobulins　(D) 絨毛膜癌監測 β-hCG

試題公告
僅供參考

17. 一位45歲男性，長期酗酒到急診就醫，主訴被鄰家養的狗咬傷頭皮，頭部傷口長度約1公分，穿刺型，頭皮傷口部位毛髮濃密，下列何項是此患者傷口感染的高風險因子？
(A) 傷口位於頭皮
(B) 年齡45歲
(C) 長期酗酒
(D) 鄰家養的狗

18. 與大腸直腸癌相關的貧血，下列何者最為可能？
(A) 再生不良性貧血
(B) 缺鐵性貧血
(C) 葉酸缺乏性貧血
(D) 維他命B_{12}缺乏性貧血

19. 針對臨床診斷與檢驗項目，下列敘述何者較恰當？
(A) 痰液抹片(sputum smear)嗜酸菌(acid-fast bacilli)報告為"Not found"，可以排除肺結核
(B) 肋膜積液細菌培養為"No growth"，可以排除膿胸
(C) 血清檢驗HIV (screening HIV-1/HIV-2 EIA)報告為"陰性"，可以排除AIDS
(D) 血中D-dimer報告為"低於正常值上限"，可以排除venous thromboembolism

20. 下列有關結核病診斷的描述，何者正確？
(A) 痰液嗜酸菌抹片 AFB not found，無法排除肺結核病
(B) 痰液嗜酸菌抹片 AFB (++)，可以確診結核病
(C) 痰液聚合酶連鎖反應(PCR)為陰性時，可以排除肺結核
(D) 肋膜積液結核菌培養 No growth，可以排除肺結核性肋膜炎

21. 一位60歲男性，吸菸約40年，因呼吸喘做肺功能檢查後診斷為COPD，最可能的檢查結果為何？
(A) FEV_1/FVC比例下降，TLC維持正常或上升，RV上升
(B) FEV_1/FVC比例上升，TLC維持正常或上升，RV下降
(C) FEV_1/FVC比例下降，TLC維持正常或下降，RV上升
(D) FEV_1/FVC比例下降，TLC維持正常，RV下降

22. 一位75歲患者，主訴近兩週頭頸部越來越腫脹，雙側上肢及眼皮皆有水腫，但雙側下肢並無水腫，頸部到前胸皮膚表層有多條靜脈擴張，但腹部平坦無異常，其最可能罹患下列哪一種疾病？
(A) pulmonary hypertension
(B) superior vena cava syndrome
(C) cardiac tamponade
(D) congestive heart failure

23. 關於滲出肋膜積液（exudative pleural effusion）之診斷標準，<u>不包括</u>下列哪一項？
(A) 肋膜積液與血清蛋白質之比值
(B) 肋膜積液與血清膽固醇之比值
(C) 肋膜積液與血清乳酸脫氫酶之比值
(D) 肋膜積液與血清糖分之比值

試題公告
僅供參考

24. 一位35歲女性，罹患第一型糖尿病已19年，因左足無法背屈 (dorsiflex)及感覺喪失而就診。理學檢查發現右下肢正常，雙側膝反射及足背動脈博動皆正常，下列何項檢查最恰當？
(A) 周邊血管疾病篩檢 ankle-brachial index (ABI)
(B) 神經傳導檢查
(C) 腦脊髓液蛋白電泳
(D) 腰部核磁共振

25. 一位50歲男性，診斷為慢性腎臟病第四期，服用furosemide 40 mg qd，主訴長期胃口不佳，倦怠，肌肉抽搐就診。實驗室檢查發現Calcium 7.1 mg/dL、albumin 2.9 g/dL，患者較可能出現下列何種徵象？
(A) Cullen's sign (+)
(B) Chvostek's sign (+)
(C) Curner's sign (+)
(D) psoas sign (+)

26. 當HBsAg、HBeAg及Anti-HBc IgM 三者都為陽性時，表示下列何種狀態？
(A) 急性B型肝炎發作
(B) 急性B型肝炎發作後六個月
(C) 慢性B型肝炎
(D) 接受B型肝炎疫苗後具免疫力

27. 一位40歲女性，出現上吐、下瀉、流口水、尿失禁、腹部絞痛、瞳孔縮小，下列何者是造成上述症狀最可能的物質？
(A) 巴拉刈除草劑
(B) 有機磷殺蟲劑
(C) 安非他命
(D) 嗎啡類止痛藥

28. 下列何種尿失禁較常發生膀胱容量變大，甚至會因為膀胱脹大而有壓痛？
(A) 壓力性尿失禁(stress incontinence)
(B) 急迫性尿失禁(urge incontinence)
(C) 溢流性尿失禁(overflow incontinence)
(D) 功能性尿失禁(functional incontinence)

29. 有關乳癌造成的肋膜積水，下列敘述何者正確？
(A) 造成肋膜積水的原因多為微血管通透性減少
(B) 臨床表徵為呼吸困難、脈搏過緩
(C) Rivalta 試驗為陽性
(D) 叩診胸部時會出現濁音，嚴重時氣管會偏向患側

30. 一位50歲女性，有腎結石病史，八個月前因大腸癌接受手術，主訴少尿一週，血清肌酸酐16.5 mg/dL，尿液檢查無異常，放置尿管後只有30 mL的尿，未排除阻塞性腎病造成急性腎衰竭的原因，下列應優先安排何種檢查？
(A) IVP (intravenous pyelography)
(B) antegrade pyelography
(C) renal ultrasonography
(D) voiding cystourethrography

31. 休克代償期間，下列何種激素會導致心臟收縮力增加及血糖上升？
(A) 留鹽激素(aldosterone)
(B) 抗利尿激素(antidiuretic hormone, ADH)
(C) 糖皮質固醇(glucocorticoids)
(D) 腎上腺素(epinephrine)

試題公告
僅供參考

32. 一位6歲的小男孩，因嘔吐及意識狀態改變被送入急診，動脈血液氣體分析：pH 7.2，P_aO_2 100 mmHg，P_aCO_2 25 mmHg，HCO_3^- 10 mEq/L；血液電解質檢查：Na^+ 126 mEq/L，K^+ 5 mEq/L，Cl^- 95 mEq/L，最可能的狀況為何？
(A) 代謝性酸中毒合併呼吸性代償，anion gap增加
(B) 代謝性鹼中毒合併呼吸性代償，anion gap正常
(C) 呼吸性酸中毒合併代謝性代償，anion gap增加
(D) 呼吸性鹼中毒合併代謝性代償，anion gap正常

33. 一位28歲女性，有三次早期懷孕流產史，來診做不孕檢查如下：夫妻身體健康，無吸菸史，甲狀腺及泌乳激素檢查正常，超音波及輸卵管攝影也無任何異常發現，建議進一步做何項檢查？
(A) 子宮內膜切片
(B) FSH/LH檢查
(C) 染色體檢查
(D) 血清抗穆氏管荷爾蒙(anti-Mullerian hormone)

34. 下列何種化療藥物經由肝臟代謝，因此施打前一定要評估肝功能？
(A) Carboplatin®
(B) Doxorubicin®
(C) Paclitaxin®
(D) Topotecan®

試題公告
僅供參考

35. 為提高受孕的機會，下列何種方法不適合用來預測排卵期？
(A) 檢測血中黃體素(progesterone)濃度
(B) 每天測量基礎體溫
(C) 一系列檢測LH(luteinizing hormone)的尿中濃度
(D) 每天注意陰道黏液的變化

36. 一位50歲婦女，G_3P_3，近期子宮頸抹片檢查呈現atypical squamous cells of unknown origin，而子宮頸人類乳突狀病毒(HPV)檢查呈現高危險型(type 16)陽性反應。下列何種檢查為最佳選擇？
(A) 立刻接受陰道鏡檢查，並且做子宮頸切片檢查
(B) 六個月後追蹤子宮頸抹片檢查
(C) 子宮內膜切片檢查
(D) 子宮頸錐狀切除

37. 卵巢癌的細胞類型屬於下列哪一種型態時，需考慮轉移性卵巢癌的可能性會大增？
(A) 黏液型
(B) 漿液型
(C) 清澈細胞型
(D) 子宮內膜型

38. 為預測卵巢功能下列何者最差？
(A) 卵子庫存AMH(anti-Mullerian hormone)：4.5 ng/mL
(B) 基礎濾泡數(antral follicle count)：3
(C) 經期第二天的濾泡刺激素(FSH)：5.74 IU/L
(D) 年齡25歲

39. 關於卵巢癌，下列敘述何者最不適當？
(A) 卵巢癌與輸卵管癌和腹膜癌的治療類似，皆以手術與化學治療為主
(B) 若有BRCA基因之突變，35歲後可考慮進行預防性切除手術
(C) 服用口服避孕藥，可減少上皮性卵巢癌之風險
(D) 定期進行婦科超音波與CA125檢查，可減少卵巢癌的死亡率

40. 一位41歲女性，下腹脹痛至門診求治。內診及超音波檢查發現雙側卵巢腫瘤。安排胃鏡檢查發現有浸潤性病灶，病理切片結果為胃癌。接受雙側卵巢輸卵管切除，顯微鏡底下發現有指環狀細胞(signet ring cell)。下列何者最為適當？
(A) 卵巢清亮細胞癌(clear cell carcinoma)
(B) 卵巢克魯根勃氏瘤(Krukenberg disease)
(C) 生殖細胞瘤(germ cell tumor)
(D) 性腺間質腫瘤(sex cord-stromal tumor)

試題公告
僅供參考

41. 下圖為骨盆腔的超音波檢查，下圖影像的診斷為何？
(A) 卵巢膿瘍(ovarian abscess)
(B) 子宮內膜異位瘤(ovarian endometriosis)
(C) 卵巢黃體囊腫(corpus lutein cyst)
(D) 多囊性卵巢症候群(PCOS)



42. 一位51歲女性，生兩胎，流產1次，因陰道不正常出血前來看診。月經週期約30日，每次持續3至4日。近6個月，經期變化約15至22日，每次持續6至7日。無特別內外科病史，理學檢查正常。骨盆腔檢查顯示子宮輕微增大，無壓痛，下一步最適當的處置為何？
(A) 低劑量的口服避孕藥
(B) 子宮內膜消融手術(endometrial ablation)
(C) 子宮內膜切片(endometrial biopsy)
(D) 子宮裝置投藥避孕器(levonorgestrel IUD)

43. 關於妊娠糖尿病的危險因子，下列何者最不相關？
(A) 前胎不明原因之胎兒死亡
(B) 多囊性卵巢症候群
(C) 子宮內膜異位症
(D) 體重過重

44. 關於子宮內膜異位症之藥物治療，下列敘述何者較不適當？
(A) 連續使用口服避孕藥可減緩子宮內膜異位症之疼痛
(B) 使用progestin、danazole或GnRH analogue可減緩子宮內膜異位症之疼痛
(C) 停止藥物治療後6到12個月，可能會有子宮內膜異位症之復發或疼痛產生
(D) progestin藥物治療可增加受孕機率

45. 一位65歲女性至門診就醫，主訴外陰部紅腫、搔癢、皮膚表面滲液。經檢查發現其陰唇出現紅斑和濕疹，醫師診斷為extramammary Paget's disease。下列敘述何項最恰當？
(A) 此症經過治療再復發機會不大
(B) 此症可以雷射治療
(C) 此症可能與癌症相關
(D) 此症好發於更年期前的婦女

46. 下列何項不是產前唐氏症篩檢四指標？
(A) 胎兒甲型蛋白 (alpha-fetoprotein)
(B) 妊娠相關血漿蛋白-A (pregnancy-associated plasma protein A)
(C) 游離性乙型人類絨毛性腺激素 (free β-hCG)
(D) 抑制素A (inhibin A)

47. 進行子宮鏡手術時，患者發生低張性子宮擴張液過度吸收的臨床表現，除了茶色尿或血尿外，不包括下列何種併發症？
(A) 呼吸不順併泡沫狀痰液
(B) 意識改變或譫妄
(C) 少尿
(D) 持續大量子宮出血

48. 一位75歲女性感覺陰道有東西跑出來造成走路不適，至門診接受子宮托的治療，下列敘述何者錯誤？
(A) 外陰開口太大或陰道過短者不適合使用子宮托治療
(B) 陰道放置子宮托，不需取出清洗照顧
(C) 可先給患者2~3週陰道雌激素藥膏
(D) 陰道瘻管為子宮托治療可能合併症

49. 一位28歲女性，曾三次的人工流產手術後月經量變少，經期規律，但每次來潮一天就結束，婚後一年未能懷孕而就診。建議下列何種檢查最適合？
(A) 子宮輸卵管攝影＋子宮鏡檢查
(B) 子宮輸卵管攝影＋陰道鏡檢查
(C) 卵巢功能檢查＋子宮輸卵管攝影
(D) 卵巢功能檢查＋腹腔鏡檢查

試題公告
僅供參考

50. 羊膜穿刺報告為 47，XX，+22[12]/46，XX[8]，請問是下列何種情況？
(A) 正常女性染色體
(B) 染色體22三套體
(C) 鑲嵌式染色體
(D) 平衡性轉位染色體

51. 一位36歲初孕婦懷孕31週，超音波檢查發現羊水AFI為4.8 cm，胎兒體重預估為1089 gm，內診無破水現象，下列處置何者最適當？
(A) 儘快生產
(B) 給予點滴輸液
(C) 臍動脈血流檢查
(D) 生理食鹽水羊膜腔灌注

52. 有關妊娠糖尿病，下列何種組合最適當？
①孕婦因為葡萄糖代謝不良，導致胎兒在酸性環境中成長受阻
②任何妊娠時間都可以測量糖化血色素(HbA_{1c})，以反映孕婦4-10週前的血糖控制狀況
③孕婦一般先採用飲食控制，假若血糖值仍未達標準，則需要配合使用口服降血糖藥物
④顧及胎兒的安全性，一律採用剖腹生產
⑤孕婦羊水中之卵磷脂與抱合髓磷脂之比值(L/S ratio)大於3：1可視為胎兒肺成熟
(A) ①+④+⑤　(B) ②+③+④
(C) ②+③+⑤　(D) ①+②+⑤

53. 一位已懷孕31週的孕婦，因子癲前症住院治療；下列處置何者最適當？
(A) 應立即施行剖腹產，避免子癲前症惡化成子癲症
(B) 給予血壓藥控制血壓；血壓應控制<110/70mmHg
(C) 給予硫酸鎂預防癲癇發生，也可作為胎兒中樞神經系統保護劑
(D) 給予硫酸鎂期間，若出現呼吸抑制現象，應立即停用並給予calcium channel blocker作為解毒劑

54. 一位35歲女性，吸菸，有骨盆腔發炎病史。G_1P_0，經由體外人工受孕(in vitro fertilization)，植入兩個胚胎，目前懷孕6週。因劇烈腹痛、陰道出血至急診，血中β-hCG為8000 mIU/mL，超音波看到子宮腔內有一個妊娠囊，但卵巢旁有病灶，如下圖，下列診斷何者最適當？

(A) 子宮外孕　(B) 黃體囊腫
(C) 輸卵管阻塞　(D) 骨盆腔積液

試題公告
僅供參考

55. 關於子宮頸癌與子宮頸原位癌，下列敘述何者最不適當？
(A) 子宮頸原位癌的患者，宜進行子宮切除手術治療
(B) 第三期子宮頸癌的首選治療為協同性放射治療加上化學治療(concurrent chemoradiation)
(C) 子宮頸癌根除手術之後，常有排尿與排便方面的問題
(D) 完成子宮頸癌疫苗注射的患者，仍須定期進行子宮頸篩檢

56. 有關婦女生殖器官的腫瘤，下列何者最不適當？
(A) 罹患卵巢癌的初期通常沒有特別症狀，在晚期則出現腹部脹痛、腹水、頻尿
(B) 子宮漿膜下層肌瘤(subserous myoma)常會導致不孕
(C) 人類乳突病毒(human papillomavirus , HPV)感染是造成子宮頸癌最重要的危險因子
(D) 子宮頸癌最常見的症狀是不正常的陰道出血

57. 請問下列何者可診斷為妊娠糖尿病？
(A) 口服50g葡萄糖後一小時血糖值為150 mg/dL
(B) 空腹血糖值92 mg/dL，口服75g葡萄糖後一至二小時血糖值分別為185、130 mg/dL
(C) 空腹血糖值92 mg/dL，口服75g葡萄糖後一至二小時血糖值分別為152、146 mg/dL
(D) 空腹血糖值92 mg/dL，口服100g葡萄糖後一至三小時血糖值分別為170、160、130 mg/dL

58. 前胎剖腹產後想要嘗試此胎陰道生產(vaginal birth after Cesarean section, VBAC)的產婦，下列適應症何者最合適？
(A) 前胎橫位，此胎臀位
(B) 前胎因胎盤早剝併發胎兒窘迫而開刀，低位橫式剖腹(low segment transverse)
(C) 前胎因曾經巨大子宮肌瘤切除後而開刀，傳統式剖腹
(D) 前胎因曾經巨大子宮肌瘤切除後而開刀，低位橫式剖腹(low segment transverse)

59. 下列何者非子宮頸環紮術(cervical cerclage)之適應症？
(A) 子宮頸原位癌曾接受一次圓錐形切除，目前16週子宮頸長度3.3公分
(B) 曾經兩次懷孕21週時無痛性流產，目前16週子宮頸長度3.3公分
(C) 目前18週，無腹痛、無子宮收縮或發炎，內診發現子宮頸口開1公分
(D) 前胎31週早產，此胎在20週例行性超音波發現子宮頸長度1公分

60. 一位36歲女性，接受不孕症治療，於hCG注射兩週後，出現體重與腹圍急速增加，腸胃不適及腹水，超音波檢查發現卵巢約12公分，下列敘述何者最適當？
(A) 因注射hCG使得外生性hCG上升，導致的卵巢過度刺激症候群
(B) 可能原因之一是卵巢受刺激增大，使其分泌富含蛋白質液體增加
(C) 需給予furosamide來排出多餘水份，減輕腹水及少尿等問題
(D) 建議規律運動促進循環以減輕體重增加問題

試題公告
僅供參考

61. 一位孕婦8週產檢血壓為110/72 mmHg；第三孕期血壓逐漸升高，於妊娠34週時，血壓約為150/104 mmHg，以驗尿試紙測試，無尿蛋白，但抽血發現肝功能異常(AST/ALT: 125/180 U/L)與血小板低下(platelet count: 70,000/μL)，下列何者為正確診斷？
(A) 子癲前症
(B) 慢性高血壓
(C) 妊娠高血壓
(D) 慢性高血壓合併子癲前症

62. 關於卵巢癌之敘述，下列何者最適當？
(A) 使用口服避孕藥可降低卵巢癌發生機率
(B) 術前評估應先排除其他來源之惡性腫瘤轉移卵巢之可能性
(C) 較常發生於停經前年輕女性
(D) 絕大部分卵巢癌為黏液性細胞型態(mucinous tumor)

63. 有關上皮卵巢癌，下列敘述何者最適當？
(A) 殘留腫瘤是卵巢癌術後重要預後因子
(B) 卵巢癌早期症狀明顯，通常早期發現，早期治療，預後良好
(C) 卵巢癌患者大多接受減積手術並輔以術後放射治療
(D) 卵巢癌與人類乳突病毒(HPV)感染有關

64. 罹患卵巢上皮細胞癌之女性，接受完整分期手術後發現為stage IC，下列處理何者最為適當？
(A) 觀察追蹤即可
(B) 靜脈化學治療紫杉醇及鉑金類(paclitaxel and carboplatin)，3-6個循環
(C) 腹膜內化學治療
(D) 會診放射腫瘤科給予放射線治療

65. Women's Health Initiative (WHI)針對更年期荷爾蒙治療，發現合併使用estrogen-progestin對下列疾病，並沒有顯示出有保護作用？
(A) 骨質疏鬆症
(B) 心血管疾病
(C) 大腸癌
(D) 髖骨骨折

66. 一位65歲婦女，主訴一尿急及咳嗽就漏尿，咳嗽也漏尿。平躺咳嗽壓力試驗無漏尿，但站立時測試有漏尿狀況；排尿後餘尿量測試有230mL。以下敘述何者最適當？
(A) 建議不可翹腳或交叉雙腿，以免增加腹壓減少想解尿的感覺
(B) 停經是尿失禁原因之一，使用雌激素可以有效改善尿失禁問題
(C) 依排尿記錄中最短的排尿間隔訂排尿時間，之後逐漸拉長解尿間隔時間
(D) 透過排尿記錄可以看出偶爾老年婦女睡覺時尿量比清醒時尿量明顯較多

67. 某婦女主訴陰道有膿狀、異味分泌物並外陰搔癢，內診時發現陰道有黃綠色分泌物，外陰部紅腫，子宮頸有草莓紅斑，子宮／卵巢皆無觸診疼痛(no lifting tenderness)，最可能的診斷為何？
(A) 子宮頸癌
(B) 急性骨盆腔感染
(C) 陰道滴蟲感染
(D) 念珠菌感染

試題公告
僅供參考

68. 一位25歲女性，因右下腹疼痛來急診。主訴疼痛由陣痛轉成持續疼痛，婦科超音波發現子宮右側附屬器(adnexa)有一直徑7公分的腫瘤。最後一次月經(LMP)的第一日在20天前。下列敘述何者最不適當？
(A) 可能診斷為右側子宮附屬器扭轉(torsion)
(B) 應準備急診手術治療
(C) 此類手術大多數需將右側子宮附屬器切除
(D) 此類手術大多數可用腹腔鏡進行

69. 某婦女想做卵巢癌之篩檢，下列敘述何者最適當？
(A) 經陰道超音波合併CA125可有效篩檢出早期卵巢癌，並降低卵巢癌相關之死亡率
(B) 其父母雙方均無卵巢癌相關家族史，故不會有BRCA1/BRCA2基因變異
(C) 若檢測出來發現BRCA1/BRCA2基因變異為陽性，其發生卵巢癌機率將比一般人高且發生年齡會較輕
(D) 若BRCA1/BRCA2基因變異為陽性，預防性卵巢輸卵管切除是可考慮的手段，不只不會發生卵巢癌，也不會發生腹膜癌

70. 懷孕32週肥胖並患有妊娠糖尿病之孕婦，飯前空腹之血糖值為132mg/dL，下列敘述何者最不適當？
(A) 在產後4-12週可回診測量血糖值
(B) 飲食控制不良的話，首選藥物為metformin
(C) 在下次懷孕前應先減重
(D) 在下次懷孕初期應抽血測量血糖值

71. 第一胎女性於懷孕15週發現無腦兒，接受終止妊娠，為降低下一胎神經管缺損機率，建議葉酸補充最適宜的劑量？
(A) 400 μg/day
(B) 800 μg/day
(C) 4,000 μg/day
(D) 8,000 μg/day

72. 以下何者非骨盆底功能障礙(pelvic floor dysfunction)？
(A) 尿失禁(urinary incontinence)
(B) 骨盆腔器官脫垂(pelvic organ prolapse)
(C) 慢性骨盆腔疼痛(chronic pelvic pain)
(D) 上腹痛症候群(epigastric pain syndrome)

73. 有關母乳哺餵，下列敘述何者最適當？
(A) 未治療活動型肺結核婦女可將乳汁擠出以奶瓶哺餵
(B) 母乳中鐵與鈣含量低，只要純母乳哺餵的新生兒皆需補充鐵與鈣
(C) 服用低劑量黃體素避孕藥婦女不適合哺乳
(D) C型肝炎婦女可以哺餵母乳，若乳頭與周圍破損則需暫停

試題公告
僅供參考

74. 當胎兒監視器發現胎兒心跳下降時，下列處置何者最不適當？
(A) 讓孕婦左側躺
(B) 給予氧氣
(C) 增加靜脈輸注
(D) 增加催產素oxytocin給予，促進產程進展

75. 關於達文西手術，下列敘述何者最適當？
(A) 較傳統腹腔鏡，能提供較好的觸覺回饋
(B) 婦科癌症患者，均不適用之
(C) 較傳統腹腔鏡手術，其精確度佳且縫合簡易快速
(D) 傳統腹腔鏡手術在子宮切除，所需時間較短

76. 關於產後照護，下列何者敘述最不適當？
(A) 在產後兩個小時內需密集監控產婦血壓與脈搏，建議15分鐘為單位。
(B) 陰道出血量需要監控，可觸壓子宮底(fundus)位置來確定子宮是否有良好收縮
(C) 若子宮收縮不良，可利用按摩方式促進其收縮
(D) 產後一小時內，若觸壓子宮底處發現子宮有明顯變大，表示子宮收縮很好

77. 一位40歲女性，因月經延遲2個月發現意外懷孕。有關遺傳診斷，下列敘述何者最不適當？
(A) 血液AFP、hCG、雌二醇、inhibin-A檢查篩檢唐氏症
(B) 以絨毛膜取樣術做染色體分析篩檢染色體異常
(C) 懷孕16週後胎兒頸後厚度≧6 mm為異常
(D) 從母血中萃取胎兒DNA來篩檢染色體異常

78. 關於間質性膀胱炎，下列敘述何者最不適當？
(A) 常見是由泌尿道感染而引起的不適症狀
(B) 可在膀胱鏡下看到glomerulations或是Hunner’s ulcer
(C) 膀胱疼痛或是合併尿急是其主要症狀
(D) 臨床上可嘗試以cystoscopy with hydrodistension(CS+HD)來緩解症狀

79. 罹患多囊性卵巢症候群，若要誘導其排卵之最優先考慮的治療方式為何？
(A) 人類促性腺激素(hMG)
(B) 促性腺釋放激素(GnRH therapy)
(C) 人類胎盤絨毛激素(hCG)
(D) 排卵藥(Clomiphene®)

80. 關於妊娠糖尿病懷孕期間之血糖控制，下列敘述何者最適當？
(A) 飯前血糖不可低於60 mg/dL
(B) 以糖化血色素(HbA_{1c}) 為最準確之追蹤指標
(C) 飯後二小時血糖監測是指吃完食物後開始算起
(D) 飲食控制2個月血糖值未達標準應使用藥物控制

試題公告
僅供參考

衛生福利部 108 年度內(外)科專科護理師甄審

【第二次筆試甄審】試題答案

報考科(組)別：婦產科組

科目：進階專科護理

【共80題，每題1.25分，共100分】

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	C	D	C	A	C	B	A	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	D	D	A	C	C	B	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	B	D	B	B	A	B	C	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	C	C	A	A	A	B	D	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	C	C	D	C	B	D	B	A	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	D	C	A	A	B	B	B	A	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	A	A	B	B	D	C	C	C	B
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	D	D	D	C	D	A	A	D	A

參考答案